

Приказ Минздрава России от 27.03.2024 N 143н  
"Об утверждении классификации природных  
лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи  
2.1 Федерального закона от 23 февраля 1995 г.  
N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах,  
лечебно-оздоровительных местностях и  
курортах", их характеристик и перечня  
медицинских показаний и противопоказаний для  
санаторно-курортного лечения и медицинской  
реабилитации с применением таких природных  
лечебных ресурсов"

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2024  
N 77708)

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ  
от 27 марта 2024 г. N 143н**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛАССИФИКАЦИИ  
ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 2  
СТАТЬИ 2.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 23 ФЕВРАЛЯ 1995 Г. N 26-ФЗ  
"О ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСАХ, ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  
МЕСТНОСТЯХ И КУРОРТАХ", ИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ПЕРЕЧНЯ  
МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ  
ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ  
РЕАБИЛИТАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТАКИХ ПРИРОДНЫХ  
ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ**

В соответствии с [пунктом 3 статьи 2.1, статьей 4](#) Федерального закона от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", [частью 5 статьи 40](#) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", [подпунктами 5.2.35 и 5.2.196 пункта 5](#) Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

[классификацию](#) природных лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи 2.1 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", их характеристики согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

[перечень](#) медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации с применением природных лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи 2.1 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:

[приказ](#) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 1029н "Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2020 г., регистрационный N 60589);

[приказ](#) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 октября 2022 г. N 664н "О внесении изменения в приложение N 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской

---

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 1029н "Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 ноября 2022 г., регистрационный N 71058);

[приказ](#) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 557н "Об утверждении классификации природных лечебных ресурсов, медицинских показаний и противопоказаний к их применению в лечебно-профилактических целях" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2021 г., регистрационный N 65177);

[приказ](#) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 марта 2022 г. N 207н "О внесении изменений в классификацию природных лечебных ресурсов, утвержденную приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 557н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 2022 г., регистрационный N 68239);

[приказ](#) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 апреля 2023 г. N 193н "О внесении изменений в приложение N 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 1029н "Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения" и в приложение N 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 557н "Об утверждении классификации природных лечебных ресурсов, медицинских показаний и противопоказаний к их применению в лечебно-профилактических целях" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2023 г., регистрационный N 73651).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 г.

Министр  
М.А.МУРАШКО

Приложение N 1  
к приказу Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 27 марта 2024 г. N 143н

**КЛАССИФИКАЦИЯ  
ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 2  
СТАТЬИ 2.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 23 ФЕВРАЛЯ 1995 Г. N 26-ФЗ  
"О ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСАХ, ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  
МЕСТНОСТЯХ И КУРОРТАХ", ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**I. Общие положения**

1. Классификация природных лечебных ресурсов (далее - классификация) осуществляется по

---

уникальности, категориям, подкатегориям, подклассам, группам, подгруппам, типам, подтипам, видам, подвидам и разновидностям природных лечебных ресурсов, используемых при санаторно-курортном лечении и медицинской реабилитации.

2. Природные лечебные ресурсы, представленные на территории Российской Федерации, классифицируются как уникальные при наличии хотя бы одного из следующих признаков:

представлены единственными в своем роде природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации;

не имеют аналогов по химическому составу и (или) агрегатному состоянию на территории Российской Федерации;

обладают исключительными лечебными свойствами, подтвержденными научными исследованиями, в том числе с учетом результатов соответствующей многолетней практики.

## **II. Минеральные воды**

3. Минеральные воды классифицируются по категориям, подкатегориям, группам, подгруппам.

4. В зависимости от целевого назначения минеральные воды классифицируются по категориям:

для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения;

питьевые.

5. В зависимости от совокупности показателей общей минерализации и содержания биологически активных компонентов в воде источника (скважины) минеральные воды, относящиеся к категории минеральных питьевых вод, классифицируются по подкатегориям:

лечебно-столовые (минерализация от 1 г/дм<sup>3</sup>, но не более 10 г/дм<sup>3</sup> или минерализация менее 1 г/дм<sup>3</sup> при наличии биологически активных компонентов, массовая концентрация которых соответствует показателям, приведенным в [абзацах восьмом - четырнадцатом пункта 6 классификации](#));

лечебные (минерализация от 10 г/дм<sup>3</sup>, но не более 15 г/дм<sup>3</sup>, или минерализация менее 10 г/дм<sup>3</sup> при наличии биологически активных компонентов, массовая концентрация которых соответствует показателям, приведенным в [абзацах двенадцатом - шестнадцатом пункта 6 классификации](#)).

6. В зависимости от основных бальнеологических показателей лечебной значимости минеральные воды классифицируются по группам:

без специфических компонентов и свойств (лечебно-профилактическое значение которых определяется основным ионно-солевым составом воды в источнике (скважине) и значением минерализации (минеральные воды для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для

---

---

внутреннего непитьевого) применения от 10,0 г/дм<sup>3</sup> и более, подготовленные для лечебных процедур, лечебно-столовые минеральные питьевые воды от 1,0 г/дм<sup>3</sup>, но не более 10,0 г/дм<sup>3</sup>, лечебные минеральные питьевые воды от 10,0 г/дм<sup>3</sup>, но не более 15,0 г/дм<sup>3</sup>);

поликомпонентного состава (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием нескольких биологически активных компонентов в воде источника (скважины) (при соответствии массовой концентрации биологически активных компонентов показателям, приведенным в [абзацах четвертом - шестнадцатом](#) настоящего пункта, для конкретной категории и (или) подкатегории минеральных вод);

сероводородные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием свободного сероводорода и гидросульфидного иона, массовая концентрация которых в воде источника (скважины) 10,0 мг/дм<sup>3</sup> и более (минеральные воды для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения);

радоновые (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием радона, массовая концентрация которого в воде источника (скважины) 5,0 нКи/дм<sup>3</sup> (185,0 Бк/дм<sup>3</sup>) и более (минеральные воды для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения);

кремнистые термы (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием кремния, массовая концентрация которого (в пересчете на метакремниевую кислоту) в воде источника (скважины) 50,0 мг/дм<sup>3</sup> и более, при температуре 35,0 градусов Цельсия и более (минеральные воды для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения);

кислые рудничные (лечебно-профилактическое значение которых определяется низким (5,0 единиц и менее) значением реакции среды (рН) и содержанием, в том числе железа, алюминия, меди и других металлов в воде источника (скважины) (минеральные воды для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения);

углекислые (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием свободного диоксида углерода (растворенного), массовая концентрация которого в минеральной воде источника (скважины) для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения составляет 700,0 мг/дм<sup>3</sup> и более, а в лечебно-столовой минеральной питьевой воде составляет 500,0 мг/дм<sup>3</sup> и более);

железистые (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием железа суммарного, массовая концентрация которого в лечебно-столовой минеральной питьевой воде источника (скважины) составляет 10,0 мг/дм<sup>3</sup> и более);

слабокремнистые (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием кремния, массовая концентрация которого (в пересчете на метакремниевую кислоту) в воде источника (скважины) составляет от 25,0 мг/дм<sup>3</sup>, но не более 50,0 мг/дм<sup>3</sup> в упакованных лечебно-столовых минеральных питьевых водах, не имеющих специальные медицинские показания к применению в лечебно-профилактических целях при отсутствии других классификационных показателей);

---

---

кремнистые (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием кремния, массовая концентрация которого (в пересчете на метакремниевую кислоту) в лечебно-столовой минеральной питьевой воде источника (скважины) составляет 50,0 мг/дм<sup>3</sup> и более);

йодные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием йода, массовая концентрация которого в минеральной воде источника (скважины) для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения, составляет 5,0 мг/дм<sup>3</sup> и более, в лечебно-столовой минеральной питьевой воде составляет от 5,0 мг/дм<sup>3</sup>, но не более 10,0 мг/дм<sup>3</sup>, а в лечебной минеральной питьевой воде составляет более 10,0 мг/дм<sup>3</sup>);

борные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием бора, массовая концентрация которого (в пересчете на ортоборную кислоту) в минеральной воде источника (скважины) для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения составляет 35 мг/дм<sup>3</sup> и более, в лечебно-столовой минеральной питьевой воде составляет от 35,0 мг/дм<sup>3</sup>, но не более 100,0 мг/дм<sup>3</sup>, а в лечебной минеральной питьевой воде составляет более 100,0 мг/дм<sup>3</sup>);

содержащие органические вещества (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием органических веществ, массовая концентрация которых в лечебно-столовой минеральной питьевой воде источника (скважины) в расчете на углерод составляет от 5,0 мг/дм<sup>3</sup>, но не более 15,0 мг/дм<sup>3</sup>, а в лечебной минеральной питьевой воде составляет более 15,0 мг/дм<sup>3</sup>);

бромные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием брома, массовая концентрация которого в минеральной воде для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения и в лечебной минеральной питьевой воде источника (скважины) составляет 25,0 мг/дм<sup>3</sup> и более);

мышьяковистые (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием природного биологически активного мышьяка, массовая концентрация которого в минеральной воде источника (скважины) для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения составляет 0,7 мг/дм<sup>3</sup> упакованной лечебной минеральной питьевой воде составляет от 0,7 мг/дм<sup>3</sup>, но не более 5,0 мг/дм<sup>3</sup>, а в нативной (неупакованной) лечебной минеральной питьевой воде составляет от 0,7 мг/дм<sup>3</sup>, но не более 20,0 мг/дм<sup>3</sup>.

7. В зависимости от соотношения ионов основного ионно-солевого состава (реже других ионов), значения минерализации, содержания спонтанных (растворенных) газов, мышьяка, железа, значения радиоактивности (радона), показателей реакции среды (далее - рН) и температуры воды в источнике (скважине), зависящих от реально существующих в природе естественных факторов их формирования (геохимических закономерностей, структурно-тектонической обстановки, литолого-фаунистического состава водовмещающих пород), минеральные воды классифицируются по подгруппам, указанным в пунктах 8 - 16 настоящей классификации.

8. В зависимости от содержания ионов основного ионно-солевого состава (реже других ионов) воды в источнике (скважине) минеральные воды классифицируются по подгруппам.

Классификация осуществляется начиная от ионов, содержащихся в меньшей концентрации, к ионам, содержащимся в большей концентрации, при этом содержание отдельных ионов основного

---

---

ионно-солевого состава (реже других ионов) должно составлять не менее 20 процент-эквивалент (далее - %-экв.).

9. В зависимости от значения минерализации минеральные воды классифицируются по подгруппам:

пресные - не более 1,0 г/дм<sup>3</sup>;

слабоминерализованные - свыше 1,0 г/дм<sup>3</sup>, но не более 2,0 г/дм<sup>3</sup>;

маломинерализованные - свыше 2,0 г/дм<sup>3</sup>, но не более 5,0 г/дм<sup>3</sup>;

среднеминерализованные - свыше 5,0 г/дм<sup>3</sup>, но не более 10,0 г/дм<sup>3</sup>;

высокоминерализованные - свыше 10,0 г/дм<sup>3</sup>, но не более 35,0 г/дм<sup>3</sup>;

рассольные (рассолы) - свыше 35,0 г/дм<sup>3</sup>, но не более 150,0 г/дм<sup>3</sup>;

крепкие рассольные (крепкие рассолы) - свыше 150,0 г/дм<sup>3</sup>, но не более 350,0 г/дм<sup>3</sup>;

очень крепкие (ультракрепкие) рассольные (ультракрепкие рассолы) - свыше 350,0 г/дм<sup>3</sup>.

10. В зависимости от содержания свободного диоксида углерода (растворенного) в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

слабоуглекислые - от 0,5 г/дм<sup>3</sup>, но не более 1,4 г/дм<sup>3</sup>;

углекислые средней концентрации - свыше 1,4 г/дм<sup>3</sup>, но не более 2,5 г/дм<sup>3</sup>;

сильноуглекислые - свыше 2,5 г/дм<sup>3</sup>.

11. В зависимости от содержания сероводорода общего ( $H_2S+HS^-$ ) в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

слабосероводородные - от 10 мг/дм<sup>3</sup>, но не более 50 мг/дм<sup>3</sup>;

сероводородные средней концентрации - свыше 50 мг/дм<sup>3</sup>, но не более 100 мг/дм<sup>3</sup>;

крепкие сероводородные - свыше 100 мг/дм<sup>3</sup>, но не более 250 мг/дм<sup>3</sup>;

очень крепкие сероводородные - свыше 250 мг/дм<sup>3</sup>, но не более 500 мг/дм<sup>3</sup>;

ультракрепкие сероводородные - свыше 500 мг/дм<sup>3</sup>.

В зависимости от значения показателя реакции среды (рН) в скобках приводится дополнительная классификационная характеристика:

при рН менее 6,5 единиц - сероводородные;

при рН от 6,5 единиц, но не более 7,5 единиц - сероводородно-гидросульфидные;

---

---

при рН выше 7,5 единиц - гидросульфидные.

12. В зависимости от содержания мышьяка в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

мышьяковистые (мышьяковые) - мышьяк в концентрации от 0,7 мг/дм<sup>3</sup>, но не более 5,0 мг/дм<sup>3</sup>;

крепкие мышьяковистые (крепкие мышьяковые) - мышьяк в концентрации выше 5,0 мг/дм<sup>3</sup>, но не более 10,0 мг/дм<sup>3</sup>;

очень крепкие мышьяковистые (очень крепкие мышьяковые) - мышьяк в концентрации выше 10,0 мг/дм<sup>3</sup>.

13. В зависимости от содержания железа в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

железистые - железо суммарное в концентрации от 10,0 мг/дм<sup>3</sup>, но не более 40,0 мг/дм<sup>3</sup>;

крепкие железистые - железо суммарное в концентрации выше 40,0 мг/дм<sup>3</sup>, но не более 100,0 мг/дм<sup>3</sup>;

очень крепкие железистые - железо суммарное в концентрации выше 100,0 мг/дм<sup>3</sup>.

14. В зависимости от значения радиоактивности (радона) в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

очень слаборадоновые - от 5 нКи/дм<sup>3</sup>, но не более 20 нКи/дм<sup>3</sup> (от 185 Бк/дм<sup>3</sup>, но не более 740 Бк/дм<sup>3</sup>);

слаборадоновые - выше 20 нКи/дм<sup>3</sup>, но не более 40 нКи/дм<sup>3</sup> (выше 740 Бк/дм<sup>3</sup>, но не более 1480 Бк/дм<sup>3</sup>);

радоновые средней концентрации - выше 40 нКи/дм<sup>3</sup>, но не более 200 нКи/дм<sup>3</sup> (выше 1480 Бк/дм<sup>3</sup>, но не более 7400 Бк/дм<sup>3</sup>);

высокорадоновые - выше 200 нКи/дм<sup>3</sup> (выше 7400 Бк/дм<sup>3</sup>).

15. В зависимости от значения показателя реакции среды (рН) в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

сильнокислые - менее 3,5 единиц;

кислые - от 3,5 единиц, но не более 5,5 единиц;

слабокислые - выше 5,5 единиц, но не более 6,8 единиц;

нейтральные - выше 6,8 единиц, но не более 7,2 единиц;

---

---

слабощелочные - свыше 7,2 единиц, но не более 8,5 единиц;

щелочные - свыше 8,5 единиц.

16. В зависимости от значения температуры в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

исключительно холодные (переохлажденные) - менее 0 градусов Цельсия;

очень холодные - от 0 градусов Цельсия, но не более 4 градусов Цельсия;

холодные - свыше 4 градусов Цельсия, но не более 20 градусов Цельсия;

теплые (слаботермальные) - свыше 20 градусов Цельсия, но не более 35 градусов Цельсия;

горячие (термальные) - свыше 35 градусов Цельсия, но не более 42 градусов Цельсия;

очень горячие (высокотермальные) - свыше 42 градусов Цельсия, но не более 100 градусов Цельсия;

исключительно горячие (перегретые) - свыше 100 градусов Цельсия.

### **III. Лечебные грязи**

17. Лечебные грязи классифицируются по типам, подтипам, видам, подвидам, разновидностям.

18. В зависимости от происхождения лечебные грязи классифицируются по типам:

торфяные (болотные отложения торфов высокой степени разложения (процент от органического вещества 40% и более), преимущественно органического состава (содержание органических веществ - 50% и более от сухого вещества);

сапропелевые (иловые отложения преимущественно пресных водоемов, содержащие 10% и более в значительной степени разложившихся органических веществ растительного и животного происхождения (процент от сухого вещества);

иловые минеральные (сульфидные) (иловые отложения преимущественно соленых водоемов, содержащие менее 10% органических веществ (процент от сухого вещества), и обычно обогащенные водорастворимыми солями и сульфидами);

сопочные (глинистые образования, выбрасываемые по тектоническим трещинам газами и напорными водами, содержащие менее 5% органических веществ (процент от сухого вещества), различное количество водорастворимых солей, и иногда сульфиды).

19. В зависимости от значения минерализации грязевого раствора лечебные грязи классифицируются по подтипам:

пресноводные - менее 1 г/дм<sup>3</sup>;

---

---

низкоминерализованные - от 1 г/дм<sup>3</sup>, но не более 15 г/дм<sup>3</sup>;

среднеминерализованные - свыше 15 г/дм<sup>3</sup>, но не более 35 г/дм<sup>3</sup>;

высокоминерализованные - свыше 35 г/дм<sup>3</sup>, но не более 150 г/дм<sup>3</sup>;

соленасыщенные - свыше 150 г/дм<sup>3</sup>.

20. В зависимости от содержания сульфидов железа в естественной грязи лечебные грязи классифицируются по видам:

бессульфидные - менее 0,01%;

слабосульфидные - от 0,01%, но не более 0,15%;

среднесульфидные - свыше 0,15%, но не более 0,50%;

сильносульфидные - свыше 0,50%.

21. В зависимости от значения зольности (процент на сухое вещество) лечебные грязи, по типам лечебных грязей, классифицируются по подвидам:

торфяные: на низкозольные (менее 5%), среднезольные (от 5%, но не более 20%), высокозольные (свыше 20%);

сапропелевые: на низкозольные (менее 30%), среднезольные (от 30%, но не более 60%), высокозольные (свыше 60%, но не более 90%);

иловые минеральные (сульфидные): на высокозольные (90% и более);

сопочные: на высокозольные (95% и более).

22. В зависимости от значения показателя реакции среды (рН) лечебные грязи классифицируются по разновидностям:

сильнокислые - менее 2,5 единиц;

кислые - от 2,5 единиц, но не более 5,0 единиц;

слабокислые - свыше 5,0 единиц, но не более 7,0 единиц;

слабощелочные - свыше 7,0 единиц, но не более 9,0 единиц;

щелочные - свыше 9,0 единиц.

#### **IV. Рапа лиманов и озер**

23. Рапа лиманов и озер классифицируется по группам, подгруппам.

24. Рапа лиманов и озер (природный насыщенный соляной раствор, по целевому назначению

---

---

относящийся к минеральным водам для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения), в зависимости от основных бальнеологических показателей лечебной значимости классифицируется по группам:

без специфических компонентов и свойств (лечебно-профилактическое значение которых определяется основным ионно-солевым составом и значением минерализации более 35 г/дм<sup>3</sup>);

бромные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием брома, массовая концентрация которого в рапе лиманов и озер составляет не менее 25 мг/дм<sup>3</sup>);

йодные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием йода, массовая концентрация которого в рапе лиманов и озер составляет не менее 5 мг/дм<sup>3</sup>);

йodo-бромные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием йода и брома, массовая концентрация которых в рапе лиманов и озер составляет не менее 25 мг/дм<sup>3</sup> брома и не менее 5 мг/дм<sup>3</sup> йода);

борные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием бора, массовая концентрация которого (в пересчете на ортоборную кислоту) в рапе лиманов и озер составляет не менее 35 мг/дм<sup>3</sup>).

25. В зависимости от соотношения ионов основного ионно-солевого состава и значения минерализации рапа лиманов и озер классифицируется по подгруппам, указанным в пунктах 26 и 27 настоящей классификации.

26. В зависимости от соотношения ионов основного ионно-солевого состава классификация рапы лиманов и озер осуществляется по подгруппам начиная от ионов, содержащихся в меньшей концентрации, к ионам, содержащимся в большей концентрации, при этом содержание отдельных ионов основного ионно-солевого состава должно составлять не менее 20%-экв.

27. В зависимости от значения минерализации рапа лиманов и озер классифицируется по подгруппам:

рассольные (рассолы) - свыше 35,0 г/дм<sup>3</sup>, но не более 150,0 г/дм<sup>3</sup>;

крепкие рассольные (крепкие рассолы) - свыше 150,0 г/дм<sup>3</sup>, но не более 350,0 г/дм<sup>3</sup>;

очень крепкие (ультракрепкие) рассольные (ультракрепкие рассолы) - свыше 350,0 г/дм<sup>3</sup>.

## **V. Бишофит**

28. Бишофит классифицируется по группам, подгруппам.

29. Бишофит (насыщенный раствор, по целевому назначению относящийся к минеральным водам для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения, по значению минерализации являющийся очень крепким (ультракрепким) рассолом (более 350,0 г/дм<sup>3</sup>), относящийся к подгруппе, соответствующей хлоридной магниевой подгруппе минеральных вод с содержанием хлоридов более 95%-экв., ионов магния более 90%-экв.) в

---

---

зависимости от содержания биологически активных компонентов классифицируется по группам:

бромные (лечебно-профилактическое значение которого определяется наличием брома, массовой концентрацией в бишофите от 2000 мг/дм<sup>3</sup>, но не более 8000 мг/дм<sup>3</sup>);

борные (лечебно-профилактическое значение которого определяется наличием бора, массовой концентрацией (в пересчете на ортоборную кислоту) в бишофите от 500 мг/дм<sup>3</sup>, но не более 2000 мг/дм<sup>3</sup>).

30. В зависимости от соотношения ионов основного ионно-солевого состава бишофит классифицируется по подгруппам.

Классификация осуществляется начиная от ионов, содержащихся в меньшей концентрации, к ионам, содержащимся в большей концентрации, при этом содержание отдельных ионов основного ионно-солевого состава должно составлять не менее 20%-экв.

## **VI. Лечебные соли**

31. Лечебные соли, приготовленные для лечебных процедур в виде раствора, классифицируются по группам, подгруппам.

32. Лечебные соли, приготовленные для лечебных процедур в виде раствора, по целевому назначению относящиеся к минеральным водам для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения, в зависимости от основных бальнеологических показателей лечебной значимости классифицируются по группам:

без специфических компонентов и свойств (лечебно-профилактическое значение которых определяется основным ионно-солевым составом и значением минерализации свыше 1 г/дм<sup>3</sup>);

бромные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием брома, массовая концентрация которого в растворе лечебных солей составляет не менее 25 мг/дм<sup>3</sup>);

йодные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием йода, массовая концентрация которого в растворе лечебных солей составляет не менее 5 мг/дм<sup>3</sup>);

йодо-бромные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием йода и брома, массовая концентрация которых в растворе лечебных солей составляет не менее 25 мг/дм<sup>3</sup> брома и не менее 5 мг/дм<sup>3</sup> йода);

борные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием бора, массовая концентрация которого (в пересчете на ортоборную кислоту) в растворе лечебных солей составляет не менее 35 мг/дм<sup>3</sup>);

поликомпонентного состава (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием нескольких биологически активных компонентов, массовая концентрация которых в растворе лечебных солей составляет не менее 25 мг/дм<sup>3</sup> брома, не менее 5 мг/дм<sup>3</sup> йода и не менее 35 мг/дм<sup>3</sup> бора (в пересчете на ортоборную кислоту)).

---

---

33. В зависимости от соотношения ионов основного ионно-солевого состава и значения минерализации растворов лечебных солей классифицируется по подгруппам, указанным в пунктах 34 и 35 настоящей классификации.

34. В зависимости от соотношения ионов основного ионно-солевого состава лечебные соли, приготовленные для лечебных процедур в виде раствора, классифицируются по подгруппам.

Классификация осуществляется начиная от ионов, содержащихся в меньшей концентрации, к ионам, содержащимся в большей концентрации, при этом содержание отдельных ионов основного ионно-солевого состава должно составлять не менее 20%-экв.

35. В зависимости от значения минерализации растворов лечебных солей классифицируется по подгруппам:

высокоминерализованные - свыше 10,0 г/дм<sup>3</sup>, но не более 35,0 г/дм<sup>3</sup>;

рассолы - свыше 35,0 г/дм<sup>3</sup>, но не более 150,0 г/дм<sup>3</sup>.

## **VII. Лечебные природные газы**

36. Природные лечебные газы классифицируются по группам.

37. Лечебные природные газы, представляющие собой геотермальные газы, близкие по составу к атмосферному воздуху, обогащенному продуктами разложения органики, основным из которых является углекислый газ (90 - 100%) с температурой свыше 20 градусов Цельсия, но не более 105 градусов Цельсия, в зависимости от уровня относительной влажности классифицируются по группам:

влажные лечебные природные газы с относительной влажностью от 45%, но не более 100%;

сухие лечебные природные газы с относительной влажностью от 15%, но не более 45%.

## **VIII. Лечебный климат**

38. Лечебный климат классифицируется по подклассам, группам.

39. В зависимости от многолетнего режима погоды лечебный климат классифицируется по подклассам:

приморский;

низкогорный - с высотой над уровнем моря от 500 м, но не более 1000 м;

среднегорный нижнего пояса - с высотой над уровнем моря свыше 1000 м, но не более 1500 м;

среднегорный верхнего пояса - с высотой над уровнем моря свыше 1500 м, но не более 2000 м;

---

---

высокогорный - с высотой над уровнем моря выше 2000 м;

равнинный лесной;

равнинный лесостепной;

равнинный полупустынный.

40. В зависимости от рельефа земной поверхности, наличия водных и растительных объектов лечебный климат классифицируется по группам:

1) приморский:

климат умеренно континентальный, с чертами морского влияния, лесной зоны;

климат умеренно континентальный, с чертами морского, жаркий и сухой, степной и полупустынной равнинной зоны;

климат умеренно континентальный, с чертами морского, степной зоны;

климат морской, умеренных широт лесной зоны;

климат средиземноморский, сухих субтропиков;

климат средиземноморский, влажной субтропической зоны, предгорный;

климат средиземноморский, субтропической зоны, предгорный;

климат муссонный, умеренных широт; летом - с влажным морским воздухом лесной зоны, зимой - с континентальным, сухим воздухом лесной зоны;

2) низкогорный, с высотой над уровнем моря от 500, но не более 1000 м:

климат умеренно континентальный, низкогорных районов, лесной зоны;

климат резко континентальный, низкогорных районов, таежной зоны;

климат резко континентальный, низкогорных районов, степной зоны;

климат резко континентальный, таежной зоны;

3) среднегорный нижнего пояса, с высотой над уровнем моря выше 1000 м, но не более 1500 м, и среднегорный верхнего пояса, с высотой над уровнем моря выше 1500 м, но не более 2000 м:

климат умеренно континентальный, среднегорный, степной зоны;

климат умеренно континентальный, среднегорный, лесной зоны;

климат резко континентальный, среднегорный, таежной зоны;

---

---

4) равнинный лесной:

климат переходный от морского к континентальному, лесной зоны;  
климат умеренно континентальный, близкий к морскому, лесной зоны;  
климат умеренно континентальный, лесной зоны;  
континентальный климат степей, таежной зоны;  
климат резко континентальный, лесной зоны;

5) равнинный лесостепной:

климат умеренно континентальный, лесостепной зоны;  
климат умеренно континентальный;

климат умеренно континентальный, предгорный;

6) равнинный полупустынный:

климат умеренно континентальный, жаркий и сухой.

Приложение N 2  
к приказу Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 27 марта 2024 г. N 143н

**ПЕРЕЧЕНЬ  
МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ  
ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ, УКАЗАННЫХ  
В ПУНКТЕ 2 СТАТЬИ 2.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 23 ФЕВРАЛЯ  
1995 Г. N 26-ФЗ "О ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСАХ,  
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЯХ И КУРОРТАХ"**

**I. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения  
и медицинской реабилитации взрослого населения с применением  
природных лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи 2.1  
Федерального закона от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ  
"О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных  
местностях и курортах"**

---

N п/п	Код по <a href="#">МКБ-10</a> <1>	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Природные лечебные ресурсы
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения при заболевании туберкулезом (класс I по <a href="#">МКБ-10</a> )				
1.	A15  A17+  A19	Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически  Туберкулез нервной системы  Милиарный туберкулез	Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения	Лечебный климат
2.	A16	Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний	Лечебный климат
3.	Z20	Контакт с больным или возможность заражения инфекционными болезнями	Риск развития активного туберкулеза у лиц из групп риска по туберкулезу	Лечебный климат
4.	A18	Туберкулез других органов	Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза	Лечебный климат
5.	B90	Последствия туберкулеза	Клиническое излечение от туберкулеза различных локализаций при наличии	Лечебный климат

			сопутствующих заболеваний и других отягощающих факторов	
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (класс III по МКБ-10)				
6.	D50	Железодефицитная анемия	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородтранспортная и иммунная).	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат
	D51.8	Другие витамин-В12-дефицитные анемии	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородтранспортная и иммунная).	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат
	D52.0	Фолиеводефицитная анемия, связанная с питанием	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородтранспортная и иммунная).	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат
	D52.8	Другие фолиеводефицитные анемии	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородтранспортная и иммунная).	
	D52.9	Фолиеводефицитная анемия неуточненная		
	D55	Анемия вследствие ферментных нарушений	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородтранспортная и иммунная)	Лечебный климат
	D60 - D64	Апластические и другие анемии		
7.	D69.4	Другие первичные тромбоцитопении	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородтранспортная и иммунная)	Лечебный климат
	D69.9	Геморрагическое состояние неуточненное		
8.	D80	Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородтранспортная и	Лечебный климат

	D81	Комбинированные иммунодефициты	иммунная)	
9.	D86.0 D86.2	Саркоидоз легких Саркоидоз легких с саркоидозом лимфатических узлов	Саркоидоз органов дыхания в фазе регрессии, фазе стабилизации при выраженных остаточных изменениях, дыхательной недостаточности не выше I степени	Лечебный климат
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по МКБ-10)				
10.	E01.0 E01.8	Диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью  Другие болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния	Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния при увеличении железы не более 2 степени	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
11.	E02	Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности	Диффузный эндемический зоб с гипотиреозом легкой степени	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
12.	E04.0 E04.1 E04.2	Нетоксический диффузный зоб  Нетоксический одноузловой зоб  Нетоксический многоузловой зоб	Диффузный эндемический зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени.  Узловой зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат  Лечебный климат
13.	E05	Тиреотоксикоз [гипертиреоз]	При увеличении щитовидной железы не	Минеральные воды (для

	E05.0	Тиреотоксикоз с диффузным зобом	более 2 степени.  Тиреотоксикоз легкой степени после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетраиодтиронин) находятся в пределах референсных значений) и средней степени без выраженных осложнений со стороны системы органов кровообращения при условии достаточной коррекции гормональных нарушений после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетраиодтиронин) находятся в пределах референсных значений в нежаркое время года)	наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
14.	E06.3	Автоиммунный тиреоидит	Увеличение щитовидной железы не более 2 степени при условии достаточной коррекции гормональных нарушений	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
	E06.5	Другой хронический тиреоидит		
15.	E07.1	Дисгормональный зоб	Эутиреоидное состояние, гипотиреоз, гипертиреоз	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
	E07.8	Другие уточненные болезни щитовидной железы		
16.	E10	Сахарный диабет 1 типа	Сахарный диабет типа 1 в пределах целевых значений гликированного гемоглобина, при стабильном течении, без наклонности к кетозу,	Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения)

			после завершения стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий	
17.	E11	Сахарный диабет 2 типа	При значениях гликированного гемоглобина, близких к целевым, при стабильном течении, без наклонности к кетозу, после завершения этапа стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий	Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения)
18.	E23.2	Несахарный диабет	Центральный несахарный диабет, хроническое течение, медикаментозная компенсация на фоне приема лекарственных препаратов группы вазопрессина и его аналогов (нормонатриемия). Отсутствие активного опухолевого процесса, который явился причиной несахарного диабета	Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
19.	E28.0 E28.3	Избыток эстрогенов  Первичная яичниковая недостаточность	В фазе компенсации, субкомпенсации	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)
20.	E66.0  E66.1	Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов  Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств	Ожирение первичное, экзогенное, конституциональное I - III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше 1 степени	Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

	E66.2  E66.8	Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией  Другие формы ожирения		
21.	E68	Последствия избыточности питания	Избыточная масса, ожирение I - III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше 1 степени, при отсутствии легочной недостаточности, апноэ, синдрома Пиквика	Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
22.	E74  E74.8	Другие нарушения обмена углеводов  Другие уточненные нарушения обмена углеводов	Нарушение толерантности к глюкозе  Нарушение гликемии натощак	Минеральные воды (питьевые)
23.	E78  E78.4	Нарушения обмена липопротеинов и другие липидемии  Другие гиперлипидемии	Гиперлипидемия в фазе медикаментозной ремиссии	Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения)
24.	E79  E79.0  E79.8	Нарушения обмена пуринов и пириимидинов  Гиперурикемия без признаков воспалительного артрита и подагрических узлов  Другие нарушения обмена пуринов и пириимидинов	В фазе обострения и ремиссии	Минеральные воды (питьевые)
25.	E83	Нарушения	В фазе компенсации и	Минеральные

	E83.8	минерального обмена Другие нарушения минерального обмена	декомпенсации	воды (питьевые)
--	-------	---	---------------	-----------------

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по [МКБ-10](#))

26.	F43.1  F45.3  F48	Посттравматическое стрессовое расстройство  Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы  Другие невротические расстройства	С умеренно выраженным общепсихологическим синдромом	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
27.	F50 - F59	Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами	С умеренно выраженным общепсихологическим синдромом	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями нервной системы (класс VI по [МКБ-10](#))

28.	G09	Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы	Последствия перенесенного менингита (лептопахименингит головного мозга, фаза ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдромов, через 3 месяца от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени без признаков судорожной готовности.	Лечебный климат
-----	-----	---	---	-----------------

			Последствия перенесенного менингита (лентопахименингит головного мозга, фаза ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдромов, через 6 - 8 месяцев от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени без признаков судорожной готовности	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
29.	G20	Болезнь Паркинсона	Дрожательная или дрожательно-риgidная форма	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
30.	G21.1 G21.2 G21.3 G21.8	Другие формы вторичного паркинсонизма, вызванного лекарственными средствами  Вторичный паркинсонизм, вызванный другими внешними факторами  Постэнцефалитический паркинсонизм  Другие формы вторичного паркинсонизма	Дрожательная или дрожательно-риgidная форма	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
31.	G22	Паркинсонизм при болезнях, классифицированных	Односторонние и двусторонние проявления без признаков нарушения	Минеральные воды (для наружного

		в других рубриках	равновесия и прогрессирования заболевания	бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
32.	G24.0  G24.3  G24.4  G24.5  G24.8	Дистония, вызванная лекарственными средствами  Спастическая кривошея  Идиопатическая рото-лицевая дистония  Блефароспазм  Прочие дистонии	I - II степень тяжести, без болевого синдрома     Все клинические формы дискинезии при выполнении высокодифференцированных движений в быстром темпе, профессиональные дискинезии от функционального перенапряжения	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи
33.	G25  G25.0  G25.1  G25.2  G25.4	Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения  Эссенциальный трепор  Тремор, вызванный лекарственным средством  Другие уточненные формы трепора  Хорея, вызванная лекарственным средством	Эссенциальный трепор без сопутствующей дистонии, без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания, без когнитивных и аффективных расстройств  Доброта качественная наследственная хорея, медленно прогрессирующее течение	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат,

	G25.5 G25.8	Другие виды хореи Другие уточненные экстрапирамидные и двигательные нарушения		
34.	G35	Рассеянный склероз	Рассеянный склероз, фаза устойчивой клинической ремиссии, отсутствие признаков стойкого нарастающего неврологического дефицита, отсутствие выраженных парезов, атаксии, чувствительных нарушений, расстройств функции тазовых органов	Лечебный климат
35.	G43.0 G43.1 G43.3	Мигрень без ауры [простая мигрень] Мигрень с аурой [классическая мигрень] Осложненная мигрень	Мигрень с аурой, без ауры (без частых кризов) в межприступный период	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
36.	G44.0 G44.2 G44.3 G44.4	Синдром "гистаминовой" головной боли Головная боль напряженного типа Хроническая посттравматическая головная боль Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не классифицированная в других рубриках	Синдром "гистаминовой" головной боли, головная боль напряжения, хроническая посттравматическая головная боль, головная боль, вызванная применением лекарственных средств, межприступный период	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи

37.	G47.0	Нарушения засыпания и поддержания сна [бессонница]	Инсомния (пре- и интрасомния) или гиперсomnia	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
	G47.1	Нарушения в виде повышенной сонливости [гиперсomnia]		
	G47.2	Нарушения цикличности сна и бодрствования		
38.	G50.0	Невралгия тройничного нерва	Невралгия тройничного нерва, атипичная лицевая боль, с редкими приступами	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи
	G50.1	Атипичная лицевая боль		
	G50.8	Другие поражения тройничного нерва		
39.	G51.0	Паралич Белла	Невропатия лицевого нерва, в том числе травматическая, поздний восстановительный период, наличие вторичной контрактуры мимической мускулатуры (через 3 - 6 месяцев после начала заболевания)	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи
	G51.1	Воспаление узла коленца лицевого нерва		
	G51.2	Синдром Россолимо-Мелькерсона		
	G51.3	Клонический гемифациальный спазм		
	G51.4	Лицевая миокимия		
	G51.8	Другие поражения лицевого нерва		
40.	G54.0	Поражения плечевого сплетения	Плечевые, пояснично-крестцовые плексопатии (компрессионно-ишемические, инфекционные,	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического
	G54.1	Поражения пояснично-крестцового сплетения		

	G54.2	Поражения шейных корешков, не классифицированные в других рубриках	автоиммунные, травматические), в том числе после оперативного лечения (не ранее чем через 3 - 6 месяцев после начала заболевания), остаточные явления при отсутствии резистентного болевого синдрома, нарушений функции тазовых органов, показаний к хирургическому лечению	применения), лечебные грязи
	G54.3	Поражения грудных корешков, не классифицированные в других рубриках		
	G54.4	Поражения пояснично-крестцовых корешков, не классифицированные в других рубриках		
	G54.5	Невралгическая амиотрофия		
	G54.6	Синдром фантома конечности с болью		
	G54.7	Синдром фантома конечности без боли		
41.	G55.1	Сдавления нервных корешков и сплетений при нарушениях межпозвоночных дисков	Радикулопатии, радикулоишемии, при дорсопатиях различного уровня с хроническим течением, при отсутствии показаний к оперативному лечению или после оперативного	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	G55.2	Сдавления нервных корешков и сплетений при спондилезе	вмешательства (не ранее 3 - 6 месяцев после операции), при отсутствии нарушений функций тазовых органов, без выраженного резистентного болевого синдрома	
	G55.3	Сдавления нервных корешков и сплетений при других дорсопатиях		
	G55.8	Сдавления нервных корешков и сплетений при других болезнях, классифицированных в других рубриках		

42.	G56.0 G56.1 G56.2 G56.3	Синдром запястного канала Другие поражения срединного нерва Поражение локтевого нерва Поражение лучевого нерва	Компрессионные, компрессионно-ишемические мононевропатии верхней конечности - синдром запястного канала, кубитального канала, поражения срединного локтевого, лучевого нервов в период остаточных явлений, ремиссии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
43.	G57.0 G57.1 G57.2 G57.3 G57.4 G57.5 G57.6	Поражение седалищного нерва Мералгия парестетическая Поражение бедренного нерва Поражение бокового подколенного нерва Поражение срединного подколенного нерва Синдром предплюсневого канала Поражение подошвенного нерва	Невропатия седалищного, бедренного, подколенного, подошвенного нервов, другие невропатии нижней конечности компрессионные, ишемические, компрессионно-ишемические, период остаточных явлений, ремиссии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи
44.	G58.0 G58.7 G58.8	Межреберная невропатия Множественный мононеврит Другие уточненные виды мононевропатии	Межреберная невропатия, множественный мононеврит, в фазе ремиссии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
45.	G60.0	Наследственная моторная и сенсорная невропатия	Наследственные моторная и сенсорная невропатии вне обострения, период	Минеральные воды (для наружного

	G60.1	Болезнь Рефсума	остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов	бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
46.	G60.2	Невропатия в сочетании с наследственной атаксией		
	G62.0	Лекарственная полиневропатия	Полиневропатии, фаза ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов.	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	G62.1	Алкогольная полиневропатия		
	G62.2	Полиневропатия, вызванная другими токсическими веществами	Полиневропатии с сенсорными и (или) двигательными нарушениями, фаза ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов.	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
47.	G62.8	Другие уточненные полиневропатии	Полиневропатии с сенсорными и вегетосенсорными нарушениями, вызванные хроническим охлаждением, вибрацией	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	G71.0	Мышечная дистрофия	Мышечная дистрофия, миотонические расстройства, врожденные миопатии, медленно	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	G71.1	Миотонические расстройства		

	G71.2	Врожденные миопатии	прогрессирующая форма, стационарное течение, 1 стадия без сопутствующих проявлений	ического применения), лечебные грязи
48.	G80	Детский церебральный паралич	Церебральные параличи без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств.	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи
49.	G90.0 G90.1 G90.2 G90.3 G90.8	Идиопатическая периферическая вегетативная невропатия Семейная дизавтономия [Райли-Дея] Синдром Горнера Полисистемная дегенерация Другие расстройства вегетативной [автономной] нервной системы	Идиопатические хронические вегетативные невропатии: идиопатическая ортостатическая гипотензия, хроническая идиопатическая вегетативная невропатия, хронический идиопатический ангиорекс, синдром постуральной ортостатической тахикардии. Расстройства вегетативной [автономной] нервной системы	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
50.	G95.1	Сосудистые миелопатии	Миелопатия в фазе ремиссии с умеренными двигательными, чувствительными нарушениями, при легких расстройствах функции тазовых органов, возможность передвигаться самостоятельно или с помощью средств опоры	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)				

51.	H01.0 H01.1	Блефарит Неинфекционные дерматозы века	Хронический блефарит вне фазы обострения	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
52.	H04.0 H04.4 H04.8	Дакриоаденит Хроническое воспаление слезных протоков Другие болезни слезного аппарата	Хронический дакриоцистит и каналикулит, фаза ремиссии, хроническое воспаление слезной железы, фаза ремиссии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
53.	H10.4	Хронический конъюнктивит	Хронический конъюнктивит в фазе ремиссии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи
54.	H15.0 H15.1	Склерит Эписклерит	Хронический склерит и эписклерит в фазе ремиссии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
55.	H16.2	Кератоконъюнктивит	Хронический кератоконъюнктивит вне обострения	Лечебный климат
56.	H20.1	Хронический иридоциклит	Хронический иридоциклит в фазе ремиссии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
57.	H22.1	Иридоциклит при	Хронический иридоциклит,	Минеральные

		болезнях, классифицированных в других рубриках	передние увеиты при нарушении обмена веществ, ревматоидном артите, анкилозирующем спондилоартрите не ранее чем через 3 месяца после начала возникновения или обострения заболевания	воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
58.	H40.1	Первичная открытоугольная глаукома	Глаукома первичная открытоугольная и закрытоугольная с нормализованным и умеренно повышенным уровнем внутриглазного давления	Лечебный климат
	H40.2	Первичная закрытоугольная глаукома		
59.	H52.1	Миопия	Миопия высокой степени	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
60.	H47.2	Атрофия зрительного нерва	Частичная атрофия зрительного нерва	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
61.	H35.5	Наследственные ретинальные дистрофии	Ретинальная (альбипунктатная) (пигментная) (желточноподобная) дистрофия,	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
	H36.0	Диабетическая ретинопатия	тапеторетинальная дистрофия	
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями уха и сосцевидного отростка (класс VIII по МКБ-10)				
62.	H65.2	Хронический серозный средний отит	Хронический средний отит вне фазы обострения	Минеральные воды (для наружного

	H65.3	Хронический слизистый средний отит		бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи
	H65.4	Другие хронические негнойные средние отиты		
63.	H73.1	Хронический мирингит	Хронический мирингит в фазе ремиссии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи
64.	H80	Отосклероз	Фаза ремиссии	Лечебный климат
65.	H90.3	Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя	Хроническая стадия. По времени возникновения: врожденная или приобретенная. I - IV степень тяжести, глухота.	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи
	H90.4	Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе	Хроническая стадия. По времени возникновения: врожденная или приобретенная. I - IV степень тяжести, глухота.	
	H90.5	Нейросенсорная потеря слуха неуточненная	Хроническая стадия. По времени возникновения: врожденная или приобретенная. I - IV степень тяжести, глухота	
66.	H93.0	Дегенеративные и сосудистые болезни уха	Фаза ремиссии	Лечебный климат
	H93.1	Шум в ушах (субъективный)		

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10)				
67.	I05.0  I05.1  I05.2	Митральный стеноз  Ревматическая недостаточность митрального клапана  Митральный стеноз с недостаточностью	Ревматические митральные пороки:  митральный стеноз при хронической сердечной недостаточности (далее - ХСН) I стадии (ФК <2> I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости (прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II - III степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса), без признаков активности процесса  Ревматический митральный порок:  митральная недостаточность, ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса.	Лечебный климат  Лечебный климат

	I05.8	Другие болезни митрального клапана	<p>Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса.</p> <p>Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, митральный стеноз при ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса.</p> <p>Ревматический митральный порок: митральный стеноз, митральная недостаточность при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса, фаза ремиссии</p>	Лечебный климат
68.	I06.1  I06.2  I06.8	Ревматическая недостаточность аортального клапана  Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью  Другие ревматические болезни аортального	Ревматический аортальный порок при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности ревматического процесса, без приступов стенокардии	Лечебный климат

		клапана		
69.	I07	Ревматические болезни трехстворчатого клапана	Ревматический триkuspidальный порок при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса	Лечебный климат
	I07.1	Триkuspidальная недостаточность		
	I07.2	Триkuspidальный стеноз с недостаточностью		
	I07.8	Другие болезни трехстворчатого клапана		
70.	I08	Поражения нескольких клапанов	Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса.	Лечебный климат
	I08.0	Сочетанные поражения митрального и аортального клапанов	Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса	
71.	I10	Эссенциальная [первичная] гипертензия	Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I - II). Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

			<p>без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II). Ожирение I - III степени.</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIА стадии (ФК II). Ожирение I - III степени</p>	
72.	I11.0	Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью	<p>Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I - II).</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II)</p>	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
	I11.9	Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности	<p>Артериальная гипертензия, стадия II, степень 1 - 2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II).</p>	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

			<p>Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIА стадии (ФК II).</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия III, степень 1 - 2, а также в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II)</p>	<p>Лечебный климат</p> <p>Лечебный климат</p>
73.	I15.0  I15.1  I15.2	<p>Реноваскулярная гипертензия</p> <p>Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек</p> <p>Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям</p>	<p>Реноваскулярная гипертензия после реконструктивных операций на почечных артериях и нефрэктомии, с нормализацией или значительным снижением артериального давления после операции, без выраженных нарушений азотовыделительной функции почек, нарушений мозгового и коронарного кровообращения, при ХСН не выше IIА стадии (ФК II), при отсутствии прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости. Достигнутый уровень физической активности должен позволять полное</p>	Лечебный климат

			<p>самообслуживание.</p> <p>Вторичные артериальные гипертензии, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН не выше IIА стадии (ФК II)</p>	<p>Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения только при ХСН не выше 1 стадии), лечебный климат (кроме высокогорного, среднегорного, низкогорного)</p>
74.	I20	Стенокардия [грудная жаба]	<p>Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК при ХСН I стадии (ФК I - II) без нарушений ритма.</p>	<p>Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат (кроме высокогорного)</p>
	I20.1	Стенокардия с документально подтвержденным спазмом	<p>Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIА стадии (ФК II).</p> <p>Стабильная стенокардия напряжения III ФК без нарушений сердечного ритма или с единичными редкими экстрасистолами, при ХСН не выше I стадии (ФК I - II)</p> <p>Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК в сочетании с артериальной гипертензией I - II стадии, 1</p>	<p>Лечебный климат</p> <p>Лечебный климат (равнинный лесной,</p>

			- 3 степени, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II)	равнинный лесостепной)
75.	I25.1	Атеросклеротическая болезнь сердца	Кардиосклероз после перенесенного первичного или повторного крупноочагового (не ранее 12 месяцев) или мелкоочагового инфаркта миокарда (не ранее 6 месяцев) при общем удовлетворительном состоянии, со стенокардией (I, II ФК), при недостаточности кровообращения не выше I стадии, а также сопутствующей гипертензивной болезни не выше II стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
	I25.2	Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда		
	I25.3	Аневризма сердца	Аневризма сердца с редкими нетяжелыми приступами стенокардии (I, II ФК), при ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости	Лечебный климат
76.	I34.1	Пролапс [пролабирование] митрального клапана	Пролапс митрального клапана I - II степени без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
77.	I41.0	Миокардит при	Состояние после	Лечебный

	I41.1	бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках  Миокардит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках	перенесенного инфекционно-аллергического миокардита при ХСН не выше IIА стадии по окончании острых и подострых явлений и без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости.  Состояние после перенесенного инфекционно-аллергического миокардита при ХСН не выше IIА стадии по окончании острых и подострых явлений и без нарушений сердечного ритма через 6 и более месяцев после окончания острых явлений при компенсации кровообращения или ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости	климат  Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
78.	I42  I43	Кардиомиопатия  Кардиомиопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках	Кардиомиопатии вследствие перенапряжения сердечной мышцы, а также обменного, эндокринного, токсического или инфекционного генеза при ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости.  Кардиомиопатии вследствие перенапряжения сердечной мышцы, а также	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат  Лечебный климат

			обменного, эндокринного, токсического или инфекционного генеза при ХСН не выше IIА стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости	
79.	I67.2  I67.4  I67.8	Церебральный атеросклероз  Гипертензивная энцефалопатия  Другие уточненные поражения сосудов мозга	1-я (компенсированная, легкая) и 2-я (субкомпенсированная, умеренная) стадии сосудистой мозговой недостаточности без выраженных интеллектуально-мнестических, аффективных, поведенческих и двигательных нарушений	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
80.	I69.0  I69.1  I69.2  I69.3  I69.4	Последствия субарахноидального кровоизлияния  Последствия внутричерепного кровоизлияния  Последствия другого нетравматического внутричерепного кровоизлияния  Последствия инфаркта мозга  Последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга	Последствия острого нарушения мозгового кровообращения в виде парезов, параличей, чувствительности, при общем удовлетворительном состоянии, стабилизации показателей церебральной и общей гемодинамики, без эпилептических приступов, с сохранением речевого контакта, через 6 - 12 месяцев после начала заболевания	Лечебный климат
81.	I70.0  I70.1	Атеросклероз аорты  Атеросклероз почечной артерии	Атеросклероз артерий нижних конечностей и терминального отдела	Минеральные воды (для наружного

	I70.2  I70.8	Атеросклероз артерий конечностей  Атеросклероз других артерий	брюшного аорты, атеросклероз других артерий в состоянии компенсации кровообращения I - II степени, в том числе после реконструктивных операций на периферических сосудах (через 6 месяцев после операции).  Те же состояния в сочетании с ишемической болезнью сердца, ХСН IIА стадии (ФК II)	бальнеотерапевтического применения), лечебный климат  Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)
82.	I73.0	Синдром Рейно	Синдром Рейно, эндартериит в состоянии компенсации и субкомпенсации кровообращения конечностей, фаза стойкой ремиссии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
83.	I83.9	Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы или воспаления	Хроническая венозная недостаточность	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
84.	I87.0  I87.2	Посттромботический синдром  Венозная недостаточность (хроническая) (периферическая)	Хроническая венозная недостаточность (II - IV степень по клинической классификации), обусловленная посттромбофлебитической болезнью (после перенесенного тромбоза глубоких вен), в том числе в стадии трофических расстройств (дерматиты, трофические язвы) при	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

			отсутствии признаков наличия тромбов в русле глубоких и поверхностных вен	
85.	I89	Другие неинфекционные болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов	Первичная и вторичная лимфодема I - III степень без лимфореи, трофических язвенных поражений	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
86.	I95.0 I95.1 I95.2	Идиопатическая гипотензия  Ортостатическая гипотензия  Гипотензия, вызванная лекарственными средствами	Эссенциальная гипотензия	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
87.	I97	Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках	Состояние после хирургического лечения ишемической болезни сердца: через 3 месяца после эндоваскулярной ангиопластики и (или) стентирования коронарных артерий, без нарушений сердечного ритма и проводимости ХСН I стадии.	Лечебный климат
	I97.1	Другие функциональные нарушения после операций на сердце	В отдаленные сроки после операции (12 месяцев и более) со стенокардией напряжения II ФК, а также в сочетании с артериальной гипертензией не выше II стадии, степени риска 2.  Состояние после митральной комиссуротомии через 6 месяцев после операции	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат  Лечебный климат (кроме высокогорного, среднегорного,

	<p>при ХСН I стадии (I - II ФК), без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости, при активности ревматического процесса не выше I стадии.</p> <p>Состояние после митральной комиссуротомии, через 9 месяцев после операции, при отсутствии активности ревматического процесса при ХСН I степени (ФК I - II), без нарушений сердечного ритма и проводимости.</p> <p>Состояние после протезирования клапанов сердца через 6 месяцев после операции при ХСН II степени (ФК II), без нарушений сердечного ритма.</p> <p>Состояние после протезирования клапанов сердца через год и более при ХСН II степени (ФК II) и без нарушения сердечного ритма и проводимости.</p> <p>Состояние после протезирования клапанов сердца при ХСН I степени.</p> <p>Состояние после хирургического лечения нарушений ритма сердца через 3 месяца после вмешательства, без нарушений сердечного ритма и проводимости.</p>	<p>низкогорного)</p> <p>Лечебный климат</p> <p>Минеральные воды, лечебный климат</p> <p>Минеральные воды, лечебный климат</p> <p>Лечебный климат</p>
--	--	--

	I97.2	Синдром постмастэктомического лимфатического отека	Первичная и вторичная лимфодема I - III стадия, без лимфореи, трофических язвенных поражений	Лечебный климат (в нежаркое время года)
--	-------	--	--	---

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями органов дыхания (класс X по [МКБ-10](#))

88.	J12.0 J12.1 J12.2	Аденовирусная пневмония  Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом  Пневмония, вызванная вирусом парагриппа	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Лечебный климат, лечебные грязи
89.	J13	Пневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i>	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Лечебный климат, лечебные грязи
90.	J14	Пневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> [палочкой Афанасьева-Пфейффера]	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Лечебный климат, лечебные грязи
91.	J15.0 J15.2	Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i>  Пневмония,	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически	Лечебный климат, лечебные грязи

	J15.3  J15.4  J15.5  J15.6  J15.7  J15.8	вызванная стафилококком  Пневмония, вызванная стрептококком группы В  Пневмония, вызванная другими стрептококками  Пневмония, вызванная Escherichia coli  Пневмония, вызванная другими грамотрицательными бактериями  Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae  Другие бактериальные пневмонии	остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	
92.	J16.0  J16.8	Пневмония, вызванная хламидиями  Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными агентами	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Лечебный климат, лечебные грязи
93.	J18	Пневмония без уточнения возбудителя	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной	Лечебный климат, лечебные грязи

			недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	
94.	J41.0  J41.1  J41.8	Простой хронический бронхит  Слизисто-гнойный хронический бронхит  Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит	Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизисто-гнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени	Лечебный климат, минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)
95.	J44.8	Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь	Хроническая обструктивная болезнь легких, легкого и среднетяжелого течения (I и II стадии), в фазе ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи, лечебные природные газы
96.	J45.0  J45.1  J45.8	Астма, с преобладанием аллергического компонента  Неаллергическая астма  Смешанная астма	Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная, легкого и среднетяжелого течения, контролируемая и частично контролируемая, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени.  Бронхиальная астма, гормонозависимая, контролируемая, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат  Лечебный климат
97.	J47	Бронхоэкститическая болезнь	Бронхоэкститическая болезнь вне обострения, без кровохарканья, при наличии дыхательной	Лечебный климат

			недостаточности не выше II степени	
98.	J60  J61  J62  J63  J64  J65  J66.0  J66.1  J66.8	Пневмокониоз углящика  Пневмокониоз, вызванный асбестом и другими минеральными веществами  Пневмокониоз, вызванный пылью, содержащей кремний  Пневмокониоз, вызванный другой неорганической пылью  Пневмокониоз неуточненный  Пневмокониоз, связанный с туберкулезом  Биссиноз  Болезнь трепальщиков льна  Болезнь дыхательных путей, вызванная другой уточненной органической пылью	Пневмокониозы в фазе полной ремиссии при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
99.	J67.0	Легкое фермера [сельскохозяйственного работника]	Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизисто-гнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии (в том числе профессиональный гиперчувствительный пневмонит (экзогенный аллергический альвеолит) при наличии дыхательной	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

	J67.2	Легкое птицевода	недостаточности не выше II степени.	
	J67.4	Легкое работающего с солодом		
	J67.5	Легкое работающего с грибами		
	J67.8	Гиперсенситивные пневмониты, вызванные другой органической пылью		
	J68.0	Бронхит и пневмонит, вызванный химическими веществами, газами, дымами иарами	Хронический профессиональный токсико-пылевой бронхит, гиперчувствительный пневмонит (экзогенный аллергический пневмонит) при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени.	
	J68.4	Химические респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами иарами	При наличии дыхательной недостаточности не выше II степени.	
	J68.8	Другие респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами иарами	Хронический токсический необструктивный бронхит при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени	

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями органов пищеварения (класс XI по МКБ-10)

100.	K20	Эзофагит	I - II стадия, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
------	-----	----------	--	---

101.	K21.0  K21.9	Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом  Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита	Рефлюкс-эзофагит, болевая, диспептическая, дисфагеальная и смешанная формы, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии.  Эзофагеальный рефлюкс легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
102.	K22.0  K22.4	Ахалазия кардиальной части  Дискинезия пищевода	Кардиоспазм, болевая, диспептическая, дисфагическая и смешанные формы, легкой и средней степени, фаза ремиссии	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
103.	K25.7	Язва желудка хроническая без кровотечения или прободения	Эрозии желудка. Язва (пептическая) пилорической части желудка, фаза ремиссии	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
104.	K26.7	Язва двенадцатиперстной кишки хроническая без кровотечения или прободения	Эрозия двенадцатиперстной кишки. Язва (пептическая) двенадцатиперстной кишки, постпилорической части, фаза ремиссии	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
105.	K28	Гастроюнальная язва	Язва (пептическая) или эрозия в фазе ремиссии: анастомоза; желудочно-ободочнокишечная; желудочно-тонкокишечная; желудочно-тощекишечная; краевая; соостья; тощекишечная	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
106.	K29.3	Хронический поверхностный гастрит	Хронический гастрит с секреторной недостаточностью, фаза ремиссии  Хронический поверхностный гастрит, фаза ремиссии	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

	K29.4  K29.8	Хронический атрофический гастрит  Дуоденит	Хронический атрофический гастрит, фаза ремиссии  Хронический дуоденит с сохраненной и повышенной секрецией, фаза ремиссии	
107.	K52.8	Другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты	Эозинофильный гастрит или гастроэнтероколит, фаза ремиссии	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
108.	K58  K58.9	Синдром раздраженного кишечника  Синдром раздраженного кишечника без диареи	Синдром раздраженного кишечника без диареи  Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени тяжести	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
109.	K59  K59.0	Другие функциональные кишечные нарушения  Запор	Другие функциональные кишечные нарушения легкой и средней степени тяжести	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
110.	K66.0  K66.8	Брюшинные спайки  Другие уточненные поражения брюшины	Брюшинные спайки абдоминальные, диафрагмальные, кишечника, тазовые, брыжейки, сальника, желудка, спаечные тяжи, возникшие после операции или воспаления брюшной полости, не вызывающие непроходимости	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
111.	K71.3	Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического персистирующего гепатита	Хронический гепатит в неактивной фазе при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

			печени при общем удовлетворительном состоянии	
112.	K73.0	Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках	Хронический гепатит в неактивной фазе, при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени, при общем удовлетворительном состоянии	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
	K73.1	Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках		
113.	K74.0	Фиброз печени	Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при нормальных показателях уровня ферментов, без желтухи и признаков печеночной недостаточности	Лечебный климат
	K74.1	Склероз печени		
	K74.3	Первичный билиарный цирроз		
114.	K80.2	Камни желчного пузыря без холецистита	Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря, за исключением форм, осложненных инфекцией, а также требующих хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), фаза ремиссии	Минеральные воды (питьевые)
115.	K81.1	Хронический холецистит	Хронический холецистит различной этиологии, без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и при нормальном значении скорости оседания эритроцитов (далее - СОЭ), фаза	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

			ремиссии	
116.	K83.0	Холангит	Без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и холестаза, при нормальном значении СОЭ, фаза ремиссии	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
117.	K86.1	Другие хронические панкреатиты	Хронический панкреатит смешанной этиологии, легкой и средней степени тяжести без выраженной внешнесекреторной недостаточности и болевого синдрома	Минеральные воды (питьевые)
118.	K91.1 K91.2 K91.4 K91.5	Синдром оперированного желудка Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках Дисфункция после колостомии и энтеростомии Постхолецистэктомический синдром	Болезни оперированного желудка (после операции по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки) с наличием демпинг-синдрома и гипогликемического синдрома легкой и средней степени тяжести, астенического синдрома, гастрита культи, панкреатита, гепатита, холецистита, энтероколита, колита	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки и врожденными аномалиями (классы XII и XVII по [МКБ-10](#))

119.	L20.8	Другие атопические дерматиты	Экзема (истинная, микробная, себорейная, профессиональная формы) в фазе полной или неполной ремиссии с умеренно выраженной аллергией. Нейродермит атопический и диффузный, фаза ремиссии	Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи
------	-------	------------------------------	--	---

120.	L23 L24 L25 L27	Аллергический контактный дерматит  Простой раздражительный [irritant] контактный дерматит  Контактный дерматит неуточненный  Дерматит, вызванный веществами, принятыми внутрь	В подострой и хронической стадии, фаза ремиссии, в том числе профессиональные	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи
121.	L28.0 L28.2	Простой хронический лишай  Другая почесуха	Ограниченный и диффузный нейродерматит, фаза ремиссии.  Почесуха легкой степени выраженности	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи
122.	L29.8	Другой зуд	Зуд кожи, хроническое течение	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
123.	L40.0 L40.5+	Псориаз обыкновенный  Псориаз артропатический	Псориаз в стационарной или регressирующей стадиях, при умеренных изменениях функционального состояния кожи, без эритродермии.  Псориаз с артрапатиями	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи
124.	L43.0	Лишай	Хроническое течение,	Минеральные

	L43.8	гипертрофический красный плоский Другой красный плоский лишай	ограниченное распространение. Красный плоский лишай (типичная, атрофическая и пигментная формы), хроническое течение, ограниченное распространение	воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
125.	L70.0 L70.8	Угри обыкновенные [acne vulgaris] Другие угри	Угри, полученные в результате профессионального заболевания, осложненные вторичной инфекцией, хроническое течение	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
126.	L85.2	Кератоз точечный (ладонно-подошвенный)	Кератоз точечный, хроническое течение	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
127.	L90.5 L91	Рубцовые состояния и фиброз кожи Гипертрофические изменения кожи	Рубцовые изменения, келоидный рубец, другие гипертрофические изменения кожи	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
128.	L94.0 L94.1 L94.3	Локализованная склеродермия [morphoea] Линейная склеродермия Склеродактилия	Склеродермия в стадии склероза кожи и атрофии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
129.	L97	Язва нижней конечности, не классифицированная в других рубриках	Трофическая и вялозаживающая рана нижней конечности в стадии эпителизации и рубцевания	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

130.	Q80.0 Q80.1 Q80.2 Q80.3 Q80.8	Ихтиоз простой Ихтиоз, связанный с X-хромосомой (X-сцепленный ихтиоз) Пластинчатый [ламеллярный] ихтиоз Врожденная буллезная ихтиозiformная эритродермия Другой врожденный ихтиоз	Наследственный ихтиоз при отсутствии пузьрей, эрозии, вторичного инфицирования	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат (в теплое время года), лечебные грязи
------	---	---	--	--

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)

131.	M02.0 M02.1 M02.2 M02.3 M02.8	Артропатия, сопровождающая кишечный шунт Постдизентерийная артропатия Постиммунизационная артропатия Болезнь Рейтера Другие реактивные артропатии	Реактивные артропатии, болезнь Рейтера, активность воспалительного процесса не выше 1 степени, при отсутствии инфекции	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи, лечебные природные газы
132.	M05 M05.8	Серопозитивный ревматоидный артрит Другие серопозитивные ревматоидные артриты	Ревматоидный артрит, серопозитивный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

			степени	
133.	M06.0	Серонегативный ревматоидный артрит	Ревматоидный артрит, серонегативный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебные природные газы
134.	M07.0 M07.2 M07.3 M07.5 M07.6	Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия Псориатический спондилит Другие псориатические артропатии Артропатия при язвенном колите Другие энтеропатические артропатии	Псориатический артрит дистальный межфаланговый, моноолигоартритический, полиартритический, псориатический спондилит, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени, без тяжелых вариантов течения сезонного дерматоза (ограниченный дерматоз, стационарная стадия)	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи
135.	M08.0	Юношеский ревматоидный артрит	Ювенильный ревматоидный артрит, спондилит, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебные природные газы

136.	M10.0	Идиопатическая подагра	Идиопатическая (первичная подагра), хронический подагрический монополиартрит, олигополиартрит, без висцеритов, течение легкое и среднетяжелое, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени	Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебные природные газы
137.	M15.0 M15.1 M15.2 M15.3 M15.4	Первичный генерализованный (остео)артроз Узлы Гебердена (с артропатией) Узлы Бушара (с артропатией) Вторичный множественный артроз Эрозивный (остео)артроз	Полиостеоартроз первичный, вторичный (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артrogenными контрактурами	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
138.	M16.0 M16.1 M16.2 M16.3 M16.4	Первичный коксартроз двусторонний Другой первичный коксартроз Коксартроз в результате дисплазии двусторонний Другие диспластические коксартрозы Посттравматический	Коксартроз первичный, вторичный (диспластический, посттравматический) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артrogenными контрактурами	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

	M16.5	коксартроз двусторонний  Другие посттравматические коксартрозы		
	M16.6	Другие вторичные коксартрозы двусторонние		
139.	M17.0	Первичный гонартроз двусторонний	Первичный, посттравматический артроз коленного сустава, в том числе связанный с профессией, без выраженного синовита, недостаточность функции суставов не выше II степени	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	M17.1	Другой первичный гонартроз		
	M17.2	Посттравматический гонартроз двусторонний		
	M17.3	Другие посттравматические гонартрозы		
	M17.4	Другие вторичные гонартрозы двусторонние		
140.	M19.0	Первичный артроз других суставов	Другие артрозы первичные, вторичные (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов, связанный с профессией) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	M19.1	Посттравматический артроз других суставов		
	M19.2	Вторичный артроз других суставов		
	M19.8	Другой уточненный артроз		
141.	M41.0	Инфантильный идиопатический сколиоз	Сколиозы врожденные или приобретенные, в том числе дискогенный и	Минеральные воды (для наружного

	M41.1  M41.2  M41.3  M41.4  M41.5  M41.8	Юношеский идиопатический сколиоз  Другие идиопатические сколиозы  Торакогенный сколиоз  Нервно-мышечный сколиоз  Прочие вторичные сколиозы  Другие формы сколиоза	вертерброгенный, верхнегрудной, грудной, пояснично-грудной, поясничный, комбинированный, S-образный, I - III степени	бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебные природные газы
142.	M42.0  M42.1	Юношеский остеохондроз позвоночника  Остеохондроз позвоночника у взрослых	Остеохондроз шейный, грудной, поясничный, распространенный, юношеский остеохондроз позвоночника без неврологических проявлений и выраженного болевого синдрома	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебные природные газы
143.	M45	Анкилозирующий спондилит	Ранняя, развернутая и поздняя стадия заболевания с медленно или без заметного прогрессирования, с низкой и (или) умеренной степенью активности воспалительного процесса (индекс ASDAS СРБ < 1,3; 1,3 - 2,1 соответственно), недостаточность функции суставов не выше II степени	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи
144.	M54	Дорсалгия	Рецидивирующие болевые синдромы в стадии ремиссии, компрессионно-ишемическ	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебные природные газы

			ие синдромы, в том числе связанные с профессией, шейного и пояснично-крестцового уровней без выраженного болевого синдрома	ического применения), лечебные грязи, лечебные природные газы
145.	M60.1  M60.8	Интерстициальный миозит  Другие миозиты	Хронические, травматические миозиты, периодически обостряющиеся, в неактивной фазе	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
146.	M65.2  M65.3  M65.4  M65.8	Кальцифицирующий тендинит  Щелкающий палец  Теносиновит шиловидного отростка лучевой кости [синдром де Кервена]  Другие синовиты и теносиновиты	Хронические синовиты и теносиновиты различных локализаций, периодически обостряющиеся, вторичные синовиты, нерезко выраженные, в неактивной фазе	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
147.	M70	Болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением	Профессиональные физические функциональные перегрузки кисти и пальцев рук, нерезко выраженные, в неактивной фазе	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
148.	M70.2  M70.4	Бурсит локтевого отростка  Препателлярный бурсит	Профессиональные бурситы (работа с упором на локти и (или) стоя на коленях), фаза ремиссии, без выраженного синовита	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
149.	M72.0	Ладонный фасциальный фиброматоз	Хронические фиброматозы и фасцииты различных локализаций нерезко	Минеральные воды (для наружного

	M72.1	[Дюпюитрена] Соединительнотканн ые узелки на тыльной поверхности пальцев	выраженные, фасцииты и апоневрозиты диффузные и узелковые.	бальнеотерапевт ического применения), лечебные грязи
	M72.2	Подошвенный фасциальный фиброматоз	Для пациентов после хирургической коррекции - не ранее чем через 4 - 6 месяцев после операции	
	M72.5	Фасциит, не классифицированный в других рубриках		
	M72.8	Другие фибробластические нарушения		
150.	M75.0	Адгезивный капсулит плеча	Хронические тендиниты и бурситы различных локализаций, активность воспалительного процесса не выше II степени и с нарушением функции суставов не выше I стадии. Периартрит	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевт ического применения), лечебные грязи
	M75.1	Синдром сдавления ротатора плеча		
	M75.2	Тендинит двуглавой мышцы		
	M75.3	Кальцифицирующий тендинит плеча		
	M75.4	Синдром удара плеча		
	M75.5	Бурсит плеча		
	M75.8	Другие поражения плеча		
151.	M76.0	Тендинит ягодичных мышц	Хронические тендиниты различных локализаций, активность воспалительного процесса	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевт
	M76.1	Тендинит поясничных мышц		

	M76.2	Шпора подвздошного гребешка	не выше II степени. Периартрит тазобедренного, коленного, голеностопного суставов - простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии	ического применения), лечебные грязи
	M76.3	Подвздошный большеберцовый связочный синдром		
	M76.4	Большеберцовый коллатеральный бурсит [Пеллегрини-Штиды]		
	M76.5	Тендинит области надколенника		
	M76.6	Тендинит пятого [ахиллова] сухожилия		
	M76.7	Тендинит малоберцовой кости		
	M76.8	Другие энтезопатии нижней конечности, исключая стопу		
152.	M77.0	Медиальный эпикондилит	Хронические энтезопатии различных локализаций с умеренным болевым синдромом. Периартриты: наружный и внутренний эпикондилит плеча, олекраналгия лучезапястного сустава, стопы, простая, хроническая акилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	M77.1	Латеральный эпикондилит		
	M77.2	Периартериит запястья		
	M77.3	Пяточная шпора		
	M77.4	Метатарзальная		
	M77.5	Другие энтезопатии стопы		
	M77.8	Другие энтезопатии, не классифицированные в других рубриках		
153.	M81.0	Постменопаузный остеопороз	Остеопороз первичный (постменопаузный,	Минеральные воды (питьевые и

	M81.1  M81.3  M81.4  M81.5  M81.6  M81.8	Остеопороз после удаления яичников  Постхирургический остеопороз, вызванный нарушением всасывания  Лекарственный остеопороз  Идиопатический остеопороз  Локализованный остеопороз [Лекена]  Другие остеопорозы	сенильный, идиопатический), вторичный (глюкокортикоидный и других) без наличия в анамнезе переломов, стабилизация	для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи
154.	M84.0  M84.1  M84.2  M84.3  M84.4  M84.8  M85.1	Плохое срастание перелома  Несрастание перелома [псевдоартроз]  Замедленное сращение перелома  Стрессовые переломы, не классифицированные в других рубриках  Патологические переломы, не классифицированные в других рубриках  Другие нарушения целостности кости  Флюороз скелета	Последствия перелома костей туловища и конечностей с замедленной консолидацией	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи
155.	M86.3	Хронический многоочаговый остеомиелит	Профессиональный флюороз скелета с нарушением функции движения 1 - 2 степени.	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи

	M86.4	Хронический остеомиелит с дренированным синусом	Хронический остеомиелит в фазе ремиссии	ического применения), лечебные грязи
	M86.5	Другие хронические гематогенные остеомиелиты		
	M86.6	Другой хронический остеомиелит		
	M86.8	Другой остеомиелит		

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями мочеполовой системы (XIV класс по МКБ-10)

156.	N03	Хронический нефритический синдром	Хронический гломерулонефрит без явлений недостаточности азотовыделительной функции почек, макрогематурии, высокой артериальной гипертензии (до 180 мм рт. ст.), в фазе ремиссии	Лечебный климат
157.	N04	Нефротический синдром	Нефротический синдром в фазе ремиссии, без хронической почечной недостаточности, анемии, высокой протеинурии и гипопротеинемии	Лечебный климат
158.	N11.0 N11.8	Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом  Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты	Хронический пиелонефрит в фазе ремиссии. Вторичные пиелонефриты с сохраненной азотовыделительной функцией почек и без выраженной артериальной гипертензии с компенсированной симптоматической артериальной гипертензией	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
159.	N20.0	Камни почки	Мочекаменная болезнь с	Минеральные

	N20.1 N20.2	Камни мочеточника  Камни почек с камнями мочеточника	наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня. Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия). Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии	воды (питьевые)
160.	N21.0 N21.8	Камни в мочевом пузыре  Другие камни в нижних отделах мочевых путей	Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня. Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия). Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии	Минеральные воды (питьевые)
161.	N30.1 N30.2 N30.3	Интерстициальный цистит (хронический)  Другой хронический цистит  Тригонит	Хронический цистит, тригонит, уретротригонит, фаза ремиссии	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

162.	N41.1 N41.3	Хронический простатит Простатоцистит	Хронический простатит, простатоцистит, фаза ремиссии, без структур уретры и остаточной мочи	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
163.	N45.9	Орхит, эпидидимит и эпидидимоорхит без упоминания об абсцессе	Через 2 месяца после перенесенного орхита, эпидидимита и эпидидимоорхита, фаза ремиссии	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
164.	N70	Сальпингит и оофорит	Хронический сальпингоофорит и оофорит	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	N70.1	Хронический сальпингит и оофорит	Хроническая стадия, фаза ремиссии: при неизмененной функции яичников; при наличии гипоэстрогении; при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения, либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний (первые 1 - 1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей)	
165.	N71.1	Хроническая воспалительная болезнь матки	Хронический эндометрит, миометрит, хронический метрит: при неизменной функции яичников;	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

			<p>при наличии гипоэстрогении;</p> <p>при наличии гиперэстрогении;</p> <p>при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения, либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний (первые 1 - 1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения</p> <p>послеоперационного периода и нормализации клинических показателей)</p>	<p>ического применения), лечебные грязи</p> <p>Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)</p>
166.	N73	Другие воспалительные болезни женских тазовых органов	Хронический параметрит. Хроническая стадия, период ремиссии: при неизменной функции яичника;	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	N73.1	Хронический параметрит и тазовый целлюлит	при наличии гипоэстрогении;	
	N73.6	Тазовые перитонеальные спайки у женщин	при наличии гиперэстрогении;	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)

			оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний (первые 1 - 1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей). Спаечный процесс в малом тазу как результат хронического сальпингоофорита и (или) оперативного вмешательства на органах женской половой системы: при неизменной функции яичника	
167.	N80.0 N80.1 N80.2 N80.3 N80.4	Эндометриоз матки Эндометриоз яичников Эндометриоз маточных труб Эндометриоз тазовой брюшины Эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища	Эндометриоз, не требующий оперативного вмешательства, или после оперативного лечения (первые 1 - 1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей)	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)
168.	N85.4	Неправильное положение матки	Фиксированное или субфиксированное неправильное положение матки (антеверзия, ретрофлексия, ретроверзия) как результат перенесенного воспалительного процесса женских половых органов,	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

			<p>проведенного ранее оперативного вмешательства на органах женской половой сферы, перенесенного ранее пельвеоперитонита: при неизменной функции яичника;</p> <p>при наличии гипоэстрогении; при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения, либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний (первые 1 - 1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей)</p>	
169.	N95.1  N95.3	<p>Менопаузные и климактерические состояния у женщин</p> <p>Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой</p>	<p>Легкая и средняя степень тяжести климактерического синдрома при отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению.</p> <p>Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой (посткастрационный синдром как следствие оперативного лечения доброкачественных новообразований женской</p>	<p>Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)</p> <p>Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи</p>

			половой сферы)	
170.	N97.1	Женское бесплодие трубного происхождения	<p>Женское бесплодие трубно-перитонеального генеза.</p> <p>Непроходимость маточных труб вследствие хронического сальпингоофорита:</p> <p>при неизменной функции яичников;</p> <p>при наличии гиперэстрогении;</p> <p>при наличии гиперэстрогении</p>	<p>Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебный климат</p> <p>Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи</p> <p>Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи</p>

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (XIX класс по МКБ-10)

171.	T52 T52.0	Токсическое действие органических растворителей  Токсическое действие нефтепродуктов	Токсическое поражение системы крови и нервной системы	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
------	--------------	--	---	---

	T52.1	Токсическое действие бензола		
	T52.2	Токсическое действие гомологов бензола		
	T52.3	Токсическое действие гликолей		
	T52.4	Токсическое действие кетонов		
	T52.8	Токсическое действие других органических растворителей		
	T52.9	Токсическое действие органических растворителей неуточненных		
172.	T53	Токсическое действие галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводородов	Токсическое поражение системы крови, токсические гепатиты, токсическое поражение нервной системы	Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	T53.0	Токсическое действие четыреххлористого углерода		
	T53.1	Токсическое действие хлороформа		
	T53.2	Токсическое действие трихлорэтилена		
	T53.3	Токсическое действие тетрахлорэтилена		
	T53.4	Токсическое действие		

		дихлорметана		
173.	T56	Токсическое действие металлов	Токсическое поражение системы крови и нервной системы, органов дыхания	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	T56.0	Токсическое действие свинца и его соединений		
	T56.1	Токсическое действие ртути и ее соединений		
	T56.7	Токсическое действие бериллия и его соединений		
	T56.8	Токсическое действие других металлов		
174.	T57	Токсическое действие других неорганических веществ	Токсическое поражение центральной и периферической нервной системы	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	T57.0	Токсическое действие мышьяка и его соединений		
	T57.1	Токсическое действие фосфора и его соединений		
	T57.2	Токсическое действие марганца и его соединений		
175.	T58	Токсическое действие окиси углерода		
176.	T59	Токсическое действие других газов, дымов и паров		Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

177.	T60 T65	Токсическое действие пестицидов  Токсическое действие других и неуточненных веществ	Токсическое поражение системы крови, токсические гепатиты, токсическое поражение нервной системы. Последствия острых отравлений и (или) хронической интоксикации	Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
178.	T66	Неуточненные эффекты излучения	Заболевания центральной нервной и сердечно-сосудистой систем без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без ХСН (ФК I - II), без диэнцефальных кризов, при компенсированной функции крови	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
179.	T69.8	Другие уточненные результаты воздействия низкой температуры	Периферический ангиодистонический синдром верхних и/или нижних конечностей, полинейропатии с сенсорными нарушениями нерезкими	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)
180.	T70.0  T70.1	Баротравма уха  Баротравма придаточной пазухи	Состояние после баротравмы уха и придаточных полостей носа при отсутствии синдрома Меньера	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
181.	T75.2	Воздействие вибрации	Вибрационная болезнь (периферический ангиодистонический синдром, сенсорные полинейропатии, остеоартрозы луче-пястных и локтевых суставов) 1 и 2	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

	T75.4	Воздействие электрического тока	степени. В фазе компенсации функций пораженных органов.	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
	T75.8	Другие уточненные эффекты воздействия внешних причин	Поражения центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, вестибулярного аппарата, связанные с воздействием инфразвука, при отсутствии синдрома Меньера, без дизэнцефальных кризов.  Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без ХСН (ФК I - II).  Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2, при ХСН I стадии (ФК I - II)	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
182.	T90	Последствия травм головы	Последствия черепно-мозговой травмы в виде легких когнитивных, вестибулоатактических нарушений, псевдобульбарного синдрома, парезов легкой и умеренной степени выраженности, при нечастых эпилептических припадках (не более 2 раз в год), внутричерепной гипертензии легкой	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи

			степени, не ранее 1 года после травмы. Последствия черепно-мозговой травмы в виде выраженных двигательных расстройств, но при отсутствии психоорганического синдрома, не ранее чем через 1 год после травмы	
183.	T91	Последствия травм шеи и туловища	Последствия травм, не ранее 1 года после травмы, фаза ремиссии. При выраженных двигательных нарушениях, нарушениях функции тазовых органов, не ранее чем через 1 год после травмы	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
184.	T92	Последствия травм верхней конечности	В период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее чем через 1 год после травмы	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
185.	T93	Последствия травм нижней конечности	В период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее чем через 1 год после травмы	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
186.	T95.2	Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности	Состояние после перенесенных термических или химических ожогов и обморожения верхней конечности на стадии формирования рубцовой ткани.	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебный климат
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с факторами, влияющими на состояние здоровья и обращения в учреждения				

здравоохранения (XXI класс по МКБ-10)				
187.	Z57.0	Неблагоприятное воздействие производственного шума	Без признаков воздействия шума на орган слуха.	Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебный климат
	Z57.1	Неблагоприятное воздействие производственной радиации	Отдельные признаки воздействия производственной радиации, без функциональных нарушений.	
	Z57.2	Неблагоприятное воздействие производственной пыли	Отдельные признаки воздействия производственной пыли на органы дыхания без дыхательной недостаточности.	
	Z57.3	Неблагоприятное воздействие других производственных загрязнителей воздуха	Признаки воздействия производственных загрязнителей воздуха на органы дыхания без дыхательной недостаточности.	
	Z57.4	Неблагоприятное воздействие токсических веществ в сельском хозяйстве	Отдельные признаки воздействия токсичных веществ на нервную, кроветворную и гепатобилиарную системы, без функциональных нарушений.	
	Z57.5	Неблагоприятное воздействие токсических веществ в других производствах	Отдельные признаки воздействия токсичных веществ на нервную, кроветворную и гепатобилиарную системы, без функциональных нарушений.	
	Z57.6	Неблагоприятное воздействие производственных экстремальных	Последствия профессионального острого теплового воздействия и отморожений.	

	Z57.7	температур Неблагоприятное воздействие производственной вибрации	Отдельные признаки воздействия производственной вибрации на периферическую нервную и сосудистую системы, скелетно-мышечную систему, без функциональных нарушений.	
	Z57.8	Неблагоприятное воздействие других факторов риска	Отдельные признаки воздействия производственных факторов на различные органы и системы, без функциональных нарушений	
188.	Z58.4	Воздействие радиационного загрязнения	Отдельные признаки воздействия радиационного загрязнения, без функциональных нарушений	Лечебный климат

<1> Международная статистическая [классификация](#) болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (далее - МКБ-10).

<2> Функциональный класс (далее - ФК).

**II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации детского населения с применением природных лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи 2.1 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах"**

N п/п	Код по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Природные лечебные ресурсы
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при				

заболеваний туберкулезом (I класс по МКБ-10)				
1.	A15	Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения	Лечебный климат
	A17+	Туберкулез нервной системы		
	A19	Милиарный туберкулез		
2.	A16	Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически	Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии.	Лечебный климат
	B90	Последствия туберкулеза	Клинически излеченный туберкулез	
3.	R76.1	Аномальная реакция на туберкулиновую пробу	Риск развития активного туберкулеза у детей из групп риска по туберкулезу	Лечебный климат
	Z20.1	Контакт с больным или возможность заражения туберкулезом		
4.	A18	Туберкулез других органов	Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза, осложнения после введения вакцины против	Лечебный климат
	Y58.0	Вакцина БЦЖ		

		туберкулеза при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии. Клинически излеченный туберкулез	
--	--	--	--

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболевании вирусными гепатитами (I класс по [МКБ-10](#))

5.	B18	Хронический вирусный гепатит	При отсутствии активности биохимических показателей аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы	Лечебный климат
	B18.0	Хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом		
	B18.1	Хронический вирусный гепатит В без дельта-агента	При отсутствии активности процесса	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат
	B18.2	Хронический вирусный гепатит С		
	B18.8	Другой хронический вирусный гепатит		

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по [МКБ-10](#))

6.	E10	Инсулинзависимый сахарный диабет	В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритом	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат

7.	E11	Инсулиннезависимый сахарный диабет	В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный (в фазе ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритом	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат
8.	E13	Другие уточненные формы сахарного диабета	В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный (в фазе ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритом	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат
9.	E25 E25.0	Адреногенитальные расстройства  Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов	Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов в состоянии компенсации	Лечебный климат
10.	E27 E27.1	Другие нарушения надпочечников  Первичная недостаточность коры надпочечников	Первичная недостаточность коры надпочечников в состоянии компенсации	Лечебный климат
11.	E31	Полигландулярная дисфункция	Автоиммунная полигландулярная	Лечебный климат

	E31.0	Автоиммунная полигландулярная недостаточность	недостаточность в состоянии компенсации	
12.	E64	Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ	Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ в стадии субкомпенсации.	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
	E64.0	Последствия белково-энергетической недостаточности		
	E64.1	Последствия недостаточности витамина А		
	E64.2	Последствия недостаточности витамина С		
	E64.3	Последствия рахита	Рахитические искривления	
	E64.8	Последствия недостаточности других витаминов		
13.	E66	Ожирение	Ожирение I - III степени: первичное: экзогенно-конституциональное, алиментарное; вторичное: церебральное, гипоталамическое, гипофизарное и другие.	Лечебный климат
	E66.0	Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов		
	E66.1	Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств	Ожирение III и IV степени	
	E66.2	Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией		

	E66.8	Другие формы ожирения		
14.	E84	Кистозный фиброз	Кистозный фиброз (в фазе ремиссии) при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени	Лечебный климат
	E84.0	Кистозный фиброз с легочными проявлениями		
	E84.1	Кистозный фиброз с кишечными проявлениями		
	E84.8	Кистозный фиброз с другими проявлениями		

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по [МКБ-10](#))

15.	F48	Другие невротические расстройства	Невротическое расстройство, в стадии компенсации, вне обострения	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
16.	F48.8	Другие уточненные невротические расстройства		
	F51	Расстройства сна неорганической этиологии	Инсомния (пресомния, интрасомния и постсомния), гиперсомния, расстройство сна неорганической этиологии без выраженного нарушения общего состояния	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
	F51.0	Бессонница неорганической этиологии		
	F51.1	Сонливость [гиперсомния] неорганической этиологии		
17.	F51.2	Расстройство режима сна и бодрствования неорганической этиологии		
	F95	Тики	Тики транзиторные, хронические моторные и	Минеральные воды (для
	F95.0	Транзиторные тики		

	F95.1	Хронические моторные тики или вокализмы	вокализмы в стадии компенсации	наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
	F95.2	Комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков [синдром де ла Туретта]		
	F95.8	Другие тики		

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями нервной системы (класс VI по [МКБ-10](#))

18.	G09	Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы	Последствия перенесенного менингита, менингоэнцефалита, миелита, энцефалита, энцефаломиелита без грубых интеллектуальных нарушений. Негрубые парезы и параличи, гипоталамический синдром, не ранее 3 месяцев от даты начала заболевания. Без сопутствующих соматических нарушений (осложнений) в стадии декомпенсации.	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
19.	G35	Рассеянный склероз	Без грубых интеллектуальных нарушений. Негрубые парезы и параличи, не требующие постоянного индивидуального ухода	Лечебный климат
20.	G43 G43.0 G43.1	Мигрень Мигрень без ауры [простая мигрень] Мигрень с аурой [классическая мигрень]	Мигрень умеренной и тяжелой степени тяжести, в фазе ремиссии не менее 3 месяцев.	Лечебный климат

	G43.3	Осложненная мигрень	Мигрень любой степени тяжести, ассоциированная форма, в фазе ремиссии не менее 3 месяцев	
21.	G43.8	Другая мигрень		
	G56	Мононевропатии верхней конечности	Последствия перенесенной острой невропатии срединного, локтевого, лучевого и другой невропатии верхней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	G56.0	Синдром запястного канала		
	G56.1	Другие поражения срединного нерва		
	G56.2	Поражение локтевого нерва		
	G56.3	Поражение лучевого нерва		
22.	G56.8	Другие мононевропатии верхней конечности		
	G57	Мононевропатии нижней конечности	Последствия перенесенной острой невропатии нижней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	G57.0	Поражение седалищного нерва		
	G57.1	Мералгия парестетическая		
	G57.2	Поражение бедренного нерва		
	G57.3	Поражение бокового подколенного нерва		
	G57.4	Поражение срединного подколенного нерва		
	G57.5	Синдром предплюсневого канала		
	G57.6	Поражение подошвенного нерва		

	G57.8	Другие мононевралгии нижней конечности		
23.	G60 G60.0	Наследственная и идиопатическая невропатия  Наследственная моторная и сенсорная невропатия	Наследственные моторная и сенсорная невропатии Русси-Леви, Шарко-Мари-Тута	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
24.	G61 G61.0	Воспалительная полиневропатия  Синдром Гийена-Барре	Последствия перенесенной острой полиневропатии, не ранее чем через 3 месяца от начала заболевания, без соматических осложнений	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
25.	G71 G71.0 G71.2 G71.3 G71.8	Первичные поражения мышц  Мышечная дистрофия  Брожденные миопатии  Митохондриальная миопатия, не классифицированная в других рубриках  Другие первичные поражения мышц	Без грубых двигательных нарушений, без соматических осложнений	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
26.	G80 G80.1 G80.2 G80.3	Детский церебральный паралич  Спастическая диплегия  Детская гемиплегия  Дискинетический церебральный паралич	Детские церебральные параличи с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале системы классификации больших моторных функций (далее - GMFCS), и без грубых интеллектуальных нарушений	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

	G80.4  G80.8	Атаксический церебральный паралич  Другой вид детского церебрального паралича		
27.	G81  G81.0  G81.1	Гемиплегия  Вялая гемиплегия  Спастическая гемиплегия	Гемипарез с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
28.	G82  G82.0  G82.1  G82.3  G82.4	Параплегия и тетраплегия  Вялая параплегия  Спастическая параплегия  Вялая тетраплегия  Спастическая тетраплегия	Парапарез и тетрапарез с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
29.	G83  G83.0  G83.1  G83.2	Другие паралитические синдромы  Диплегия верхних конечностей  Моноплегия нижней конечности  Моноплегия верхней конечности	Парезы с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)				
30.	H01	Другие воспаления век	Хронические дерматозы вне обострения	Минеральные воды (для

	H01.1	Неинфекционные дерматозы века		наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
31.	H10	Конъюнктивит	Хронические конъюнктивиты вне обострения	Лечебный климат
	H10.4	Хронический конъюнктивит	Хронические блефароконъюнктивиты вне обострения	
	H10.5	Блефароконъюнктивит		
32.	H15	Болезни склеры	Хронический склерит в фазе ремиссии	Лечебный климат
	H15.0	Склерит		
	H15.1	Эписклерит	Хронический эписклерит в фазе ремиссии	
33.	H16	Кератит	Хронические кератоконъюнктивиты в фазе ремиссии	Лечебный климат
	H16.2	Кератоконъюнктивит		
34.	H20	Иридоциклит	Хронический иридоциклит в фазе ремиссии	Лечебный климат
	H20.1	Хронический иридоциклит		
35.	H30	Хориоретинальное воспаление	Хронический хориоретинит в фазе ремиссии	Лечебный климат
36.	H52	Нарушения рефракции и аккомодации	Прогрессирующая миопия низкой, средней степени, в том числе состояния после операции по поводу близорукости (через 1 - 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства)	Лечебный климат
	H52.1	Миопия		
37.	H55	Нистагм и другие непроизвольные движения глаз	Оптический нистагм и другие непроизвольные движения глаз	Лечебный климат
38.	Q15.0	Врожденная	Компенсированная форма	Лечебный

		глаукома		климат
39.	S05	Травма глаза и глазницы	Состояние после проникающих ранений глаз (не ранее чем через 1 - 2 месяца после травмы) и контузий глаза (не ранее чем через 1 месяц после травмы)	Лечебный климат

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями уха и сосцевидного отростка (класс VIII по [МКБ-10](#))

40.	H90.3  H90.4  H90.5	Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя  Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе  Нейросенсорная потеря слуха неуточненная	Хроническая стадия. По времени возникновения: врожденная или приобретенная. I - IV степень тяжести, глухота.  Хроническая стадия. По времени возникновения: врожденная или приобретенная. I - IV степень тяжести, глухота.  Хроническая стадия. По времени возникновения: врожденная или приобретенная. I - IV степень тяжести, глухота.	Лечебный климат
-----	---------------------------------	--	--	-----------------

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями системы кровообращения (класс IX по [МКБ-10](#))

41.	I01	Ревматическая лихорадка с вовлечением сердца	Ревматизм в неактивной фазе без порока сердца после выписки из стационара. Ревматизм в неактивной фазе (не ранее 8 - 10 месяцев после окончания атаки, рецидива) без порока сердца	Лечебный климат
42.	I05	Ревматические	Ревматизм в неактивной	Лечебный

		болезни митрального клапана	фазе с умеренной полнотой компенсированной изолированной недостаточностью митрального или аортального клапанов, с комбинированным митрально-аортальным пороком при компенсации или недостаточности	климат
43.	I06	Ревматические болезни аортального клапана		
44.	I07	Ревматические болезни трехстворчатого клапана		
45.	I08	Поражения нескольких клапанов	кровообращения не выше I стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости (прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц, пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц, политопная, групповая, частая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II - III степени, двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса)	
46.	I09.0	Ревматический миокардит	Ревматический миокардит, неактивная фаза, при хронической сердечной недостаточности не выше I стадии (ФК I)	Лечебный климат
47.	I10	Эссенциальная (первичная) гипертензия	Первичная артериальная гипертензия, I - IIБ стадии, без недостаточности кровообращения, фаза медикаментозной ремиссии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического

				применения), лечебный климат
48.	I11.9	Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности	Лабильная артериальная гипертензия, высокое нормальное давление. Лабильная артериальная гипертензия, стадия I	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
49.	I30.0	Острый неспецифический идиопатический перикардит	Неактивная фаза, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Лечебный климат
	I30.1	Инфекционный перикардит		
	I30.8	Другие формы острого перикардита		
	I30.9	Острый перикардит неуточненный		
50.	I33	Острый и подострый эндокардит	Неактивная фаза, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Лечебный климат
	I33.9	Острый эндокардит неуточненный		
51.	I34	Неревматические поражения митрального клапана	Недостаточность митрального клапана до II степени, аускультативная и немая формы без нарушения гемодинамики, без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости.	Лечебный климат
	I34.0	Митральная (клапанная) недостаточность		
	I34.8	Другие неревматические поражения митрального клапана	Другие неревматические поражения митрального клапана без нарушения гемодинамики в стадии компенсации порока.	

52.	I35	Неревматические поражения аортального клапана	Неревматические поражения аортального клапана в стадии компенсации порока.	Лечебный климат
	I35.1	Аортальная (клапанная) недостаточность	Недостаточность аортального клапана не выше II степени	
	I35.8	Другие поражения аортального клапана		
53.	I40.0	Инфекционный миокардит	Миокардит в фазе ремиссии, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Лечебный климат
	I40.1	Изолированный миокардит		
	I40.8	Другие виды острого миокардита		
	I40.9	Острый миокардит неуточненный		
54.	I42.0	Дилатационная кардиомиопатия	Кардиомиопатия, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Лечебный климат
	I42.1	Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия		
	I42.2	Другая гипертрофическая кардиомиопатия		
	I42.5	Другая рестриктивная кардиомиопатия		
	I42.7	Кардиомиопатия, обусловленная воздействием лекарственных средств и других внешних факторов		
	I42.8	Другие кардиомиопатии		

	I42.9	Кардиомиопатия неуточненная		
55.	I44.0	Предсердно-желудочковая блокада первой степени	Предсердно-желудочковая блокада I и II степени, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
	I44.1	Предсердно-желудочковая блокада второй степени		
56.	I45.8	Другие уточненные нарушения проводимости	Синусовая брадикардия, отсутствие ХСН	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
57.	I49.1	Преждевременная деполяризация предсердий	Экстрасистолия, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
	I49.2	Преждевременная деполяризация, исходящая из соединения		
	I49.3	Преждевременная деполяризация желудочеков		
	I49.4	Другая и неуточненная преждевременная деполяризация		
58.	I95	Гипотензия	Эссенциальная гипотензия, отсутствие ХСН	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
	I95.0	Идиопатическая гипотензия		
	I95.1	Ортостатическая гипотензия		
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями органов дыхания (класс X по МКБ-10)				

59.	J12	Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках	Бронхопневмония в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	Лечебный климат
60.	J13	Пневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i>	Бронхопневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i> в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	Лечебный климат
61.	J14	Пневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> [палочкой Афанасьева-Пфейффера]	Бронхопневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	Лечебный климат
62.	J15	Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках	Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Mycoplasma pneumoniae</i> , стафилококком, стрептококком группы В и другими стрептококками (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания).	Лечебный климат
	J15.0	Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i>		
	J15.2	Пневмония, вызванная стафилококком	Другие бактериальные пневмонии, пневмония, вызванная другими аэробными	
	J15.3	Пневмония, вызванная стрептококком группы В	грамотрицательными бактериями в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	
	J15.4	Пневмония, вызванная другими стрептококками		
	J15.5	Пневмония, вызванная <i>Escherichia coli</i>		
	J15.6	Пневмония,		

	J15.7	вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями  Пневмония, вызванная <i>Mycoplasma pneumonia</i>		
	J15.8	Другие бактериальные пневмонии		
63.	J17	Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках	Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках: коклюше, микозах, паразитарных болезнях в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	Лечебный климат
	J17.0	Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках		
	J17.2	Пневмония при микозах		
	J17.3	Пневмония при паразитарных болезнях		
64.	J41	Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит	Рецидивирующий бронхит, хронический бронхит, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	Лечебный климат
65.	J43	Эмфизема	Синдром Мак-Леода, эмфизема легких, в том числе при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	Лечебный климат
	J43.0	Синдром Мак-Леода		
66.	J44	Другая хроническая обструктивная легочная болезнь	Хронический обструктивный бронхит неспецифического	Лечебный климат

	J44.8	Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь	характера: в фазе неполной ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени; в фазе полной ремиссии	
67.	J45	Астма	Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная контролируемая, частично контролируемая и интерmittтирующая при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	Лечебный климат (исключая расположенные во влажной субтропической зоне)

**Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с  
болезнями органов пищеварения (класс XI по МКБ-10)**

68.	K20	Эзофагит	Пептический эзофагит, легкой и средней тяжести, фаза полной ремиссии	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
69.	K21	Гастроэзофагеальный рефлюкс	Гастроэзофагеальный рефлюкс, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии	Минеральные воды (питьевые)
	K21.0	Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом		
	K21.9	Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита		
70.	K22	Другие болезни пищевода	Ахалазия кардиальной части и язва пищевода, легкой и средней степени тяжести, без осложнений, фаза ремиссии	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
	K22.0	Ахалазия кардиальной части		
	K22.1	Язва пищевода		
71.	K25	Язва желудка	Язва желудка, неосложненная форма, фаза клинико-эндоскопической ремиссии	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

72.	K26	Язва двенадцатиперстной кишки	Язва двенадцатиперстной кишки неосложненной формы, фаза клинико-эндоскопической ремиссии	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
73.	K29 K29.3 K29.8	Гастрит и дуоденит Хронический поверхностный гастрит Дуоденит	Гастрит и дуоденит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссии	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
74.	K52 K52.2	Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит	Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссии	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
75.	K58 K58.9	Синдром раздраженного кишечника Синдром раздраженного кишечника без диареи	Синдром раздраженного кишечника без диареи, фаза ремиссии, с запором легкой и средней степени тяжести	Минеральные воды (питьевые)
76.	K59 K59.0	Другие функциональные кишечные нарушения Запор	Другие функциональные кишечные нарушения средней степени тяжести	Минеральные воды (питьевые)
77.	K73 K73.0	Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках	Хронический гепатит, при отсутствии активности процесса при нормальных показателях уровня тканевых ферментов или незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени	Минеральные воды (питьевые)

	K73.1	Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках		
78.	K74 K74.0 K74.1 K74.3	Фиброз и цирроз печени Фиброз печени Склероз печени Первичный билиарный цирроз	Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при регрессирующем течении (без желтухи, при нормальных показателях трансаминаз, билирубина) и признаков печеночной недостаточности	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
79.	K76 K76.0	Другие болезни печени Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках	Жировая дегенерация печени при отсутствии активности процесса	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
80.	K80 K80.1 K80.2 K80.5	Желчнокаменная болезнь [холелитиаз] Камни желчного пузыря с другим холециститом Камни желчного пузыря без холецистита Камни желчного протока без холангита или холецистита	Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря, неосложненная форма, не требующая хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), вне фазы обострения	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
81.	K81 K81.1	Холецистит Хронический холецистит	Хронический холецистит при отсутствии активности воспалительного процесса	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
82.	K82 K82.8	Другие болезни желчного пузыря Другие уточненные	Спайки пузырного протока, желчного пузыря Дискинезия пузырного	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

		болезни желчного пузыря	протока, желчного пузыря	
83.	K86	Другие болезни поджелудочной железы	Хронический панкреатит, вне периода обострения при отсутствии активности воспалительного процесса, без склонности к частым	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
	K86.1	Другие хронические панкреатиты		

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки (класс XII по [МКБ-10](#))

85.	L40	Псориаз	Псориаз вне обострения.	Минеральные
	L40.0	Псориаз обыкновенный	Псориаз зимней формы в летнее время года	воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный
	L40.1	Генерализованный пустулезный псориаз		климат, лечебные грязи,
	L40.2	Акродерматит стойкий [Аллопо]		лечебные природные газы
	L40.3	Пустулез ладонный и подошвенный		
	L40.4	Псориаз каплевидный		
	L40.8	Другой псориаз		
86.	L63	Гнездная алопеция	Алопеция, фаза ремиссии	Лечебный
	L63.0	Алопеция тотальная		климат

	L63.1	Алопеция универсальная		
	L63.2	Гнездная плешивость (лентовидная форма)		
	L63.8	Другая гнездная алопеция		
87.	L85	Другие эпидермальные утолщения	Ихтиоз, кератоз (кератодермия) легкой и средней степени тяжести, кроме грибковых поражений	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевт ического применения)
	L85.0	Приобретенный ихтиоз		
	L85.1	Приобретенный кератоз [кератодермия] ладонно-подошвенн ый		
	L85.2	Кератоз точечный (ладонный-подошвен ный)		
	L85.3	Ксероз кожи		
	L85.8	Другие уточненные эпидермальные утолщения		
88.	L91	Гипертрофические изменения кожи	Келоидный рубец, другие гипертрофические изменения кожи	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевт ического применения)
	L91.0	Келоидный рубец		
	L91.8	Другие гипертрофические изменения кожи		
89.	L94	Другие локализованные изменения соединительной ткани	Склеродермия (кроме системных форм), фаза ремиссии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевт ического применения), лечебные грязи
	L94.0	Локализованная склеродермия		

	L94.1	[morphea] Линейная склеродермия		
	L94.8	Другие уточненные локализованные изменения соединительной ткани		

Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)

90.	B91	Последствия полиомиелита	Последствия полиомиелита в резидуальном периоде с наличием негрубых вялых парезов, не требующих постоянного индивидуального ухода	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
91.	M02 M02.2 M02.3 M02.8	Реактивные артропатии Постиммунизационная артропатия Болезнь Рейтера Другие реактивные артропатии	Реактивные артропатии, неактивная фаза инфекционного процесса	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
92.	M07 M07.0 M07.1 M07.2	Псориатические и энтеропатические артропатии Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия Мутлирующий артрит Псориатический спондилит	Артропатии, артрит: дистальный межфаланговый, олигоартрит, псориатический спондилит, активность заболевания не выше I степени, функциональная недостаточность суставов не выше II степени, без висцеритов, ограниченный псориаз, стационарная стадия	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

	M07.3	Другие псориатические артропатии		
93.	M08	Юношеский (ювенильный) артрит	Без висцеритов, активность заболевания не выше I степени, при условии самостоятельного самообслуживания и передвижения	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи
	M08.0	Юношеский ревматоидный артрит		
	M08.1	Юношеский анкилозирующий спондилит		
	M08.2	Юношеский артрит с системным началом		
	M08.3	Юношеский полиартрит (серонегативный)		
	M08.4	Пауциартикулярный юношеский артрит		
	M08.8	Другие юношеские артриты		
94.	M33	Дерматополимиозит	Фаза ремиссии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи
	M33.0	Юношеский дерматомиозит		
95.	M36	Системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках	Фаза ремиссии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)
	M36.2	Артропатия при гемофилии		
96.	M40	Кифоз и лордоз	Кифозы, лордозы I, II	Минеральные

	M40.0 M40.1 M40.2 M40.3 M40.4	Кифоз позиционный Другие вторичные кифозы Другие и неуточненные кифозы Синдром прямой спины Другие лордозы	степени	воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)
97.	M41 M41.0 M41.1 M41.2 M41.3 M41.5 M41.8	Сколиоз Инфантильный идиопатический сколиоз Юношеский идиопатический сколиоз Другие идиопатические сколиозы Торакогенный сколиоз Прочие вторичные сколиозы Другие формы сколиоза	Сколиозы I, II, III степени	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)
98.	M42 M42.0	Остеохондроз позвоночника Юношеский остеохондроз позвоночника	Болезнь Шейермана, болезнь Кальве, фаза ремиссии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
99.	M91	Юношеский остеохондроз бедра и таза	Болезнь Легга-Кальве-Пертеса и иные остеохондрозы бедра	Минеральные воды (для наружного

	M91.0	Юношеский остеохондроз таза	и таза, фаза ремиссии	бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	M91.1	Юношеский остеохондроз головки бедренной кости [Легга-Кальве-Пертеса]		
	M91.3	Псевдококсалигия		
	M91.8	Другие юношеские остеохондрозы бедра и таза		
100.	M92	Другие юношеские остеохондрозы	Болезнь Шлаттера, Келлера, Шинца и иные юношеские остеохондрозы	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	M92.0	Юношеский остеохондроз плечевой кости		
	M92.1	Юношеский остеохондроз лучевой кости и локтевой кости		
	M92.2	Юношеский остеохондроз кисти		
	M92.3	Другой юношеский остеохондроз верхних конечностей		
	M92.4	Юношеский остеохондроз надколенника		
	M92.5	Юношеский остеохондроз большой и малой берцовых костей		
	M92.6	Юношеский остеохондроз предплюсны		
	M92.7	Юношеский		

	M92.8	остеохондроз плюсны  Другой уточненный юношеский остеохондроз		
--	-------	--	--	--

Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями мочеполовой системы (класс XIV по [МКБ-10](#))

101.	N03	Хронический нефритический синдром	Хронический гломерулонефрит, гематурическая форма, IgA-нефропатия (болезнь Берже)	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат
102.	N04	Нефротический синдром	Хронический гломерулонефрит, нефротическая форма, фаза стойкой клинико-лабораторной ремиссии не менее 1 года	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат
103.	N07	Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках	Наследственный нефрит (болезнь Альпорта), болезнь тонких базальных мембранных	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат
104.	N11	Хронический тубулоинтерстициальный нефрит	Хронический тубулоинтерстициальный нефрит, необструктивный хронический пиелонефрит, хронический обструктивный пиелонефрит без нарушений уродинамики, фаза ремиссии	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат
	N11.0	Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом		
	N11.1	Хронический обструктивный пиелонефрит		
	N11.8	Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты		
105.	N13	Обструктивная уропатия и	Рефлюкс-нефропатия, пузырно-мочеточниковый	Лечебный климат

	N13.0  N13.1  N13.2  N13.4  N13.5  N13.7  N13.8	рефлюкс-уропатия  Гидронефроз с обструкцией лоханочно-мочеточникового соединения  Гидронефроз со структурой мочеточника, не классифицированный в других рубриках  Гидронефроз с обструкцией почки и мочеточника камнем  Гидроуретер  Перегиб и структура мочеточника без гидронефроза  Уропатия, обусловленная пузырно-мочеточниковым рефлюксом  Другая обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия	рефлюкс 1 - 2 степени, аномалии мочевыводящих путей (гидронефроз, гидроуретер): неосложненные, без сопутствующего воспалительного процесса, фаза полной клинико-лабораторной ремиссии при несущественных нарушениях уродинамики; неосложненные, без сопутствующего воспалительного процесса, без нарушений уродинамики; не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства	
106.	N15	Другие тубулоинтерстициальные болезни почек	Кристаллурия (уратурия, оксалурия, фосфатурия, цистеинурия и иные)	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат
107.	N18  N18.8	Хроническая почечная недостаточность  Другие проявления хронической почечной недостаточности	Хроническая почечная недостаточность в стадии субкомпенсации или компенсации	Лечебный климат
108.	N20	Камни почки и мочеточника	Мочекаменная болезнь без нарушения уродинамики,	Минеральные воды (питьевые),

	N20.0 N20.1 N20.2	Камни почки Камни мочеточника Камни почек с камнями мочеточника	не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства	лечебный климат
109.	N30 N30.1 N30.2 N30.3	Цистит Интерстициальный цистит (хронический) Другой хронический цистит Тригонит	Хронический цистит, тригонит, фаза ремиссии	Лечебный климат
110.	N31 N31.0 N31.1 N31.2 N31.8	Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках Незаторможенный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках Рефлекторный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках Нейрогенная слабость мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках Другие нервно-мышечные дисфункции мочевого пузыря	Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря при отсутствии стойкого недержания мочи	Лечебный климат
111.	N70 N70.1	Сальпингит и оофорит Хронический	Хроническая стадия, фаза ремиссии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевт

		сальпингит и оофорит		ического применения), лечебный климат, лечебные грязи
112.	N71	Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки	Хронический эндометрит, фаза ремиссии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевт ического применения), лечебный климат
	N71.1	Хронические воспалительные болезни матки		
113.	N76	Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы	Хронический вульвовагинит в фазе ремиссии	Лечебный климат, лечебные грязи
	N76.1	Подострый и хронический вагинит		
114.	N91	Отсутствие менструаций, скудные и редкие менструации	Первичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, после исключения органической патологии.	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевт ического применения), лечебный климат, лечебные грязи
	N91.0	Первичная аменорея		
	N91.1	Вторичная аменорея	Вторичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, воспалительными изменениями в матке, в том числе внутриматочными синехиями.	
	N91.3	Первичная олигоменорея	Первичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие	

	N91.4	Вторичная олигоменорея	перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках.  Вторичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках	
115.	N94  N94.0  N94.3  N94.4  N94.5	Болевые и другие состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом  Боли в середине менструального цикла  Синдром предменструального напряжения  Первичная дисменорея  Вторичная дисменорея	Боли в середине менструального цикла, обусловленные функциональными причинами и последствиями воспалительных процессов органов малого таза.  Синдром предменструального напряжения легкой и средней степени тяжести, тяжелой степени.  Первичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза.  Вторичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат, лечебные грязи

			хирургических вмешательств на органах малого таза	
116.	N99	Нарушения мочеполовой системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках	Перитонеальные тазовые спайки любой степени распространения после хирургических вмешательств на органах брюшной полости и малого таза	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат, лечебные грязи

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при врожденных аномалиях [пороках развития], деформациях и хромосомных нарушениях  
(класс XVII по [МКБ-10](#))

117.	Q21	Врожденные аномалии [пороки развития] сердечной перегородки	Врожденные аномалии (пороки развития) сердечной перегородки: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;	Лечебный климат
	Q21.0	Дефект межжелудочковой перегородки	недостаточность кровообращения не выше I стадии;	
	Q21.1	Дефект предсердной перегородки	не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии	
	Q21.2	Дефект предсердно-желудочк овой перегородки	недостаточность кровообращения не выше I стадии	
	Q21.3	Тетрада Фалло		
	Q21.4	Дефект перегородки между аортой и легочной артерией		
	Q21.8	Другие врожденные аномалии сердечной перегородки		
118.	Q22	Врожденные аномалии [пороки развития] легочного и трехстворчатого	Врожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов:	Лечебный климат

		клапанов  Q22.2 Врожденная недостаточность клапана легочной артерии  Q22.3 Другие врожденные пороки клапана легочной артерии  Q22.5 Аномалия Эбштейна  Q22.6 Синдром правосторонней гипоплазии сердца  Q22.8 Другие врожденные аномалии трехстворчатого клапана	после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии; не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии	
119.	Q23	Врожденные аномалии [пороки развития] аортального и митрального клапанов  Q23.1 Врожденная недостаточность аортального клапана  Q23.3 Врожденная митральная недостаточность  Q23.4 Синдром левосторонней гипоплазии сердца  Q23.8 Другие врожденные аномалии аортального и митрального клапанов	Врожденные аномалии (пороки развития) аортального и митрального клапанов: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии; не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии	Лечебный климат
120.	Q24	Другие врожденные аномалии [пороки	Другие врожденные аномалии (пороки	Лечебный климат

		развития] сердца	развития) сердца: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;	
	Q24.0	Декстрокардия	не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства,	
	Q24.1	Левокардия	недостаточность кровообращения не выше I	
	Q24.2	Трехпредсердное сердце	стадии	
	Q24.4	Врожденный субаортальный стеноз		
	Q24.5	Аномалия развития коронарных сосудов		
	Q24.8	Другие уточненные врожденные аномалии сердца		
121.	Q32	Врожденные аномалии [пороки развития] трахеи и бронхов	Врожденные пороки развития трахеи, бронхов (врожденная трахеомаляция, врожденная бронхомаляция, врожденный стеноз бронхов, другие врожденные аномалии бронхов): дыхательная недостаточность не выше 2 степени;	Лечебный климат
	Q32.0	Врожденная трахеомаляция	дыхательная недостаточность не выше I степени	
	Q32.1	Другие пороки развития трахеи		
	Q32.2	Врожденная бронхомаляция		
	Q32.3	Врожденный стеноз		

	Q32.4	бронхов Другие врожденные аномалии бронхов		
122.	Q33	Врожденные аномалии [пороки развития] легкого	Врожденные пороки развития легких (врожденная киста легкого, секвестрация легкого, агенезия легкого, врожденная бронхоэктазия, гипоплазия и дисплазия легкого, другие врожденные аномалии легкого): дыхательная недостаточность не выше 2 степени	Лечебный климат
	Q33.0	Врожденная киста легкого		
	Q33.1	Добавочная доля легкого		
	Q33.2	Секвестрация легкого		
	Q33.3	Агенезия легкого		
	Q33.4	Врожденный бронхоэктаз		
	Q33.5	Эктопия ткани в легком		
	Q33.6	Гипоплазия и дисплазия легкого		
	Q33.8	Другие врожденные аномалии легкого		
123.	Q63	Другие врожденные аномалии [пороки развития] почки	Врожденные аномалии (пороки развития) почки, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства	Минеральные воды (питьевые)
	Q63.0	Добавочная почка		
	Q63.1	Слившаяся, дольчатая и		

		подковообразная почка Q63.2 Эктопическая почка Q63.3 Гиперпластическая и гигантская почка Q63.8 Другие уточненные врожденные аномалии почки		
124.	Q64	Другие врожденные аномалии [пороки развития] мочевой системы  Q64.0 Эписпадия Q64.1 Экстрофия мочевого пузыря Q64.2 Врожденные задние уретральные клапаны Q64.3 Другие виды атрезии и стеноза уретры и шейки мочевого пузыря Q64.4 Аномалия мочевого протока [урахуса] Q64.5 Врожденный дивертикул мочевого пузыря и мочеиспускательного канала Q64.7 Другие врожденные аномалии мочевого пузыря и мочеиспускательного канала	Врожденные аномалии (пороки развития) мочевой системы, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства	Лечебный климат
125.	Q65	Врожденные деформации бедра	Врожденные деформации бедра не ранее чем через 6	Минеральные воды (для

	Q65.0	Врожденный вывих бедра односторонний	месяцев после хирургического лечения	наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	Q65.1	Врожденный вывих бедра двусторонний		
	Q65.3	Врожденный подвывих бедра односторонний		
	Q65.4	Врожденный подвывих бедра двусторонний		
	Q65.6	Неустойчивое бедро		
	Q65.8	Другие врожденные деформации бедра		
126.	Q66	Врожденные деформации стопы	Врожденные деформации стопы не ранее чем через 6 месяцев после хирургического лечения	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	Q66.0	Конско-варусная косолапость		
	Q66.1	Пяточно-варусная косолапость		
	Q66.2	Варусная стопа		
	Q66.3	Другие врожденные варусные деформации стопы		
	Q66.4	Пяточно-вальгусная косолапость		
	Q66.5	Врожденная плоская стопа [pes planus]		
	Q66.6	Другие врожденные вальгусные деформации стопы		
	Q66.7	Полая стопа [pes cavus]		
	Q66.8	Другие врожденные деформации стопы		

127.	Q67  Q67.5	Врожденные костно-мышечные деформации головы, лица, позвоночника и грудной клетки  Врожденные деформации позвоночника	Врожденный сколиоз	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)
128.	Q77  Q77.7	Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника  Спондилоэпифизарная дисплазия	Спондилоэпифизарная дисплазия	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
129.	Q79  Q79.6	Врожденные аномалии [пороки развития] костно-мышечной системы, не классифицированные в других рубриках  Синдром Элерса-Данло	Затрагивающие несколько систем без признаков декомпенсации, без сопутствующих соматических нарушений (осложнений)	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (класс XIX по МКБ-10)				
130.	S06	Внутричерепная травма	Последствия внутричерепной травмы (не ранее чем через 1 месяц после закрытой, не ранее чем через 5 - 6 месяцев после открытой); отдаленные последствия контузии мозга, травматическая энцефалопатия в восстановительном периоде при астеническом, психовегетативном и диэнцефальном синдромах	Лечебный климат

			без выраженной внутричерепной и артериальной гипертензии, с нарушением двигательной функции средней или легкой степени тяжести, без эпилептиформных приступов и психических расстройств	
131.	S14	Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи	<p>Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей;</p> <p>не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы;</p> <p>не ранее чем через 6 месяцев после травмы</p>	<p>Лечебный климат</p> <p>Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи</p>
132.	S24	Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе	Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства,	Лечебный климат

			<p>сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы;</p> <p>не ранее чем через 6 месяцев после травмы</p>	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
133.	S34	Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза	<p>Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей;</p> <p>не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы;</p>	Лечебный климат

			не ранее чем через 6 месяцев после травмы	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
134.	T88.8	Другие уточненные осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в других рубриках	Осложнения после хирургических вмешательств по поводу спинномозговых грыж, врожденных пороков развития нервной системы, доброкачественных опухолей головного и спинного мозга, с нарушением двигательной функции легкой или средней степени тяжести, без ликвородинамических расстройств, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
135.	T91 T91.1	Последствия травм шеи и туловища  Последствия перелома позвоночника	Последствия компрессионного перелома позвоночника, не ранее чем через 1 год после травмы	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
136.	T92 T92.0 T92.1	Последствия травм верхних конечностей  Последствие открытого ранения верхней конечности  Последствие перелома верхней конечности, исключая запястье и кисть	Артриты и артрозы травматического происхождения.  Последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате, требующие восстановления нарушенных двигательных функций	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

	T92.2	Последствие перелома на уровне запястья и кисти		
	T92.3	Последствие вывиха, растяжения и деформации верхней конечности		
	T92.4	Последствие травмы нерва верхней конечности		
	T92.5	Последствие травмы мышцы и сухожилия верхней конечности		
	T92.6	Последствие размозжения и травматической ампутации верхней конечности		
	T92.8	Последствие других уточненных травм верхней конечности		
137.	T93	Последствия травм нижней конечности	Артриты и артрозы травматического происхождения, последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате, требующие восстановления нарушенных двигательных функций	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	T93.0	Последствие открытого ранения нижней конечности		
	T93.1	Последствие перелома бедра		
	T93.2	Последствие других переломов нижней конечности		
	T93.3	Последствие вывиха, растяжения и деформации нижней конечности		
	T93.4	Последствие травмы нерва нижней конечности		

	T93.5	Последствие травмы мышцы и сухожилия нижней конечности		
	T93.6	Последствие размозжения и травматической ампутации нижней конечности		
	T93.8	Последствие других уточненных травм нижней конечности		
138.	T95	Последствия термических и химических ожогов и обморожений	Перенесенные обширные поверхностные и глубокие ожоги с восстановленным кожным покровом.	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	T95.0	Последствие термического и химического ожога и обморожения головы и шеи	Состояние после реконструктивно-восстановительных операций, произведенных по поводу контрактур и рубцовых стяжений.	
	T95.1	Последствие термического и химического ожога и обморожения туловища	Состояния после восстановительных операций на сухожилиях, пластики по поводу ожогов, а также другие виды контрактур.	
	T95.2	Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности	Дermатогенные, миогенные, артrogенные контрактуры обратимого характера, возникшие после перенесенных ожогов с восстановленным кожным покровом,	
	T95.3	Последствие термического и химического ожога и обморожения нижней конечности	келоидные и гипертрофические рубцы, развившиеся на месте ожоговых ран	
	T95.4	Последствие термических и химических ожогов,		

T95.8	классифицированных только в соответствии с площадью пораженного участка тела	
	Последствия других уточненных термических и химических ожогов и обморожений	
T95.9	Последствия неуточненных термических и химических ожогов и обморожений	

**III. Медицинские противопоказания для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации с применением природных лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи 2.1 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах"**

1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.
2. Заболевания, передающиеся половым путем.
3. Хронические заболевания в стадии обострения.
4. Воспалительные полиартропатии, системные поражения соединительной ткани, анкилозирующий спондилит, другие уточненные спондилопатии высокой степени активности.
5. Бактерионосительство инфекционных заболеваний.
6. Заразные болезни глаз и кожи.
7. Паразитарные заболевания.
8. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации <3>, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.

---

<3> Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации".

9. Туберкулез любой локализации в интенсивную фазу лечения при наличии бактериовыделения, подтвержденного бактериоскопическим, бактериологическим или молекулярно-генетическим методами;

10. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).

11. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе проведения химиотерапии.

12. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.

13. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не психоневрологического профиля).

14. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.

15. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.

16. Кахексия любого происхождения.

17. Неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания паллиативной медицинской помощи.

18. Заболевания и состояния, определенные по результатам научных исследований природных лечебных ресурсов, в том числе с учетом результатов соответствующей многолетней практики.

---